

**Fortegnelse, kontroldokument
og brugervejledning kategori B – MFAG B**

**Inventory, Control Document
and User Instructions Category B –
MFAG B**



Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning over lægemidler og medicinsk udstyr kategori B MFAG B

Jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel IX B

Inventory, Control Document and User Instructions of Active Pharmaceutical Ingredients and Medical Equipment Category B MFAG B

Cf. Danish Maritime Authority Notice A, chapter IX B

July 2025

ISBN: 978-87-7454-214-8

Identifikation af skib / Identification of ship

Skibsnavn / *Ship Name*: _____

Kaldesignal / *Call Signal*: _____

IMO nummer / *IMO Number*: _____

Hjemmehavn / *Port of Reg.*: _____

Medicin certifikat / *Medicine Certificate*

Medicin certifikat / *Medicine Certificate*

Dette dokument anses for at udgøre skibets medicin certifikat.

Det attesteres herved, at medicin og medicinsk udstyr er efterset og fundet i overensstemmelse med
Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

This document considered to represent the ships certificate of medicine.

*It certifies that medicine and medical equipment has been inspected and found in compliance with the
Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.*

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Certifikat for genoplivningsudstyr (A.1)

Certificate resuscitation equipment (A.1)

Det attesteres herved at det **mobile genoplivningsudstyr (A.1)** er efterset og fundet i overensstemmelse med Den Danske Søfartsstyrelses krav jf. Meddelelser A kapitel IX B.

It certifies that the **mobile resuscitation equipment (A.1)** has been inspected and found in compliance with the Danish Maritime Authority's requirement cf. Notes A Chapter IX B.

Skibsnavn / *Ship Name*:

Kaldesignal / *Call Signal*:

IMO nummer / *IMO Number*:

Hjemmehavn / *Port of Reg.*:

Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Næste eftersyn / <i>Next inspection</i>			
Dato / <i>Date</i>	Rank / <i>Rank</i>	Navne / <i>Name</i>	Underskrift / <i>Signature</i>
	Skibsfører / <i>Master</i>		

Indhold / Contents

Anvendte forkortelser	10
<i>Used abbreviations</i>	<i>10</i>
Brugervejledning Lægemiddelstoffer.....	11
<i>User instruction Active Pharmaceutical</i>	<i>11</i>
Fortegnelse og kontroldokument.....	54
<i>Inventory and Control Document</i>	<i>54</i>
Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine	60
Fortegnelse og kontroldokument.....	62
<i>Inventory and Control Document</i>	<i>62</i>
Labels	68
INDEX	72
Rekvisation lægemidler	77
<i>Requisition Active Pharmaceutical</i>	<i>77</i>
Mobilt genoplivnings udstyr / Akut taske	86
<i>Mobile resuscitation kit / Emergency bag</i>	<i>86</i>
Ændringer / Changes	89

De Danske Medicinkister

Medicinkisten angiver medicin/medicinsk udstyr, som Radio Medical Danmark og Søfartsstyrelsen har foretrukket indenfor de rammer som EU-direktiv 92/29/EØF og den Danske lægemiddelstyrelse har givet.

Guide til:

Brugervejledning:

Første kolonne beskriver de indikationer, lægemiddelstoffet er beregnet til. De samme indikationer kan slås op i indekset bagerst i publikationen. Første kolonne beskriver også om et lægemiddelstof skal anvendes sammen med andre lægemiddelstoffer. I sådanne tilfælde er der lavet henvisninger til de relevante lægemiddelstoffer. I samme kolonne gøres opmærksom på, om lægemiddelstoffet udgør en del af MFAG (Medical First Aid Guide) der refereres i så fald til den relevante MFAG tabel. MFAG's lægemiddelstofferne er defineret i IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koden, supplementdelen, seneste version og indarbejdet i denne version af den danske "Fortegnelse, kontrol dokument og brugervejledning".

Bemærkning: Sejlads med farligt gods jævnfør IBC koden, INF koden og IGS koden er ikke indarbejdet i denne publikation. Der henvises til disse publikationer.

Anden kolonne oplyser, Lægemiddelstoffets hoved- og undergruppenummer.

Tredje og fjerde kolonne indeholder rækker med oplysninger om:

- **Lægemiddelstoffet:** Beskriver det aktive stof i lægemidlet. Som et eksempel kan nævnes 3.1 Paracetamol. Det forhandles over hele jorden under mange forskellige handelsnavne. Derfor kan man uanset forskellige handelsnavne, altid finde lægemidlet, hvis man kender lægemiddelstoffet.
- **Form:** Beskriver om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klysma, oral opløsning eller inhalation. Form beskriver også styrken af det enkelte lægemiddelstof pr ml eller per tablet.
- **Virkning** beskriver den forventende virkning af det enkelte lægemiddel.
- **Dosering** beskriver den anbefalede dosis ved de tilstande, der er beskrevet i kolonnen indikation. Her beskrives ligeledes lægemidlets form og administrationsmåde.
Bemærkning: Radio Medical kan ordinere andre doser og administrations måder.
- **Bivirkninger** nævner de mest almindelige bivirkninger beskrevet i Dansk Lægemiddelinformation, www.medicin.dk
- **Holdbarhed** beskriver holdbarhedstiden fra produktions datoen. Holdbarhedstiden beskrevet i denne fortegnelse er fremkommet ud fra det danske handelsnavn med længst holdbarhed.
Bemærkning: Der tages forbehold for at holdbarhedstiden kan ændres.
- **Opbevaring** beskriver om der er særlige krav til opbevaring. Lægemidler skal generelt opbevares tørt og beskyttet mod lys. De fleste lægemidler tåler "almindelig temperatur" defineret som normal stuetemperatur op til 22-24° C.
- **Anmærkninger** beskriver, om der bør søges samråd med Radio Medical Danmark inden anvendelse af lægemiddelstoffet. Desuden beskrives, om der er specielle forholdsregler til det specifikke lægemiddelstof.

Advarsel: Lægemiddelstoffer, der har været opbevaret forkert, eller er blevet for gamle, kan være sundhedsskadelige.

The Danish Medicine Chest's

The medicine chest indicates the Active Pharmaceutical Ingredients / medical equipment that Radio Medical Denmark and Danish Maritime Authority have preferred within the framework of the EU Directive 92/29 / EEC and the Danish Medicines Agency.

Guide to:

User instruction:

First column describes the indication the Active Pharmaceutical Ingredients is intended for. The same indications can be looked up in the index at the back of the publication. First column also describes whether an Active Pharmaceutical Ingredient should be used together with other Active Pharmaceutical Ingredients. In such cases, a reference is made to the relevant Active Pharmaceutical Ingredient. In the same column it is noted if the Active Pharmaceutical Ingredients is part of MFAG (Medical First Aid Guide) and reference to the relevant MFAG table is made. MFAG Active Pharmaceutical Ingredients are defined in the IMDG (International Maritime Dangerous Goods) code, supplement component, latest edition, and incorporated in this version of the Danish "Inventory, control document and user manual".

Note: Sailing with dangerous goods as per the IBC code, INF code and the IGC code are not included in this publication. Please refer to these publications.

Second column describes the Active Pharmaceutical Ingredient main and subgroup numbers.

Third and fourth column contains rows with information about:

- **The Active Pharmaceutical Ingredients:** describe the Active Pharmaceutical Ingredients in the medicine. An example is 3.1 Paracetamol, which is sold all over the world under many different trade names. Regardless of different trade names it is always possible to locate the medicine, if you know the Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Form:** describes if the Active Pharmaceutical Ingredients is available as capsules, tablets, suppositories, injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation. Form also describes the strength of each active pharmaceutical ingredient per ml or per tablet.
- **Effect** describes the expected effect of each Active Pharmaceutical Ingredients.
- **Dosage** describes the recommended dose for the condition described in the column indication. The form of the Active Pharmaceutical Ingredients as well as the usual administration is mentioned.
Note: Radio Medical may prescribe different doses and ways of administration.
- **Side effects** describes the most common side effects mentioned in the Danish Drug Information, www.medicin.dk. There is currently no English version.
- **Durability** describes the time of durability from date of production. The durability mentioned in this record is derived from the Danish trade name with the longest durability.
Note: Durability may be subject to change.
- **Storage** describes if special storage precautions are needed. The Active Pharmaceutical Ingredients should generally be kept dry and protected from light. Most medicaments tolerate "normal temperature" defined as normal room temperature up to 22-24° C.
- **Remarks** describe whether it is recommended to seek advice from Radio Medical Denmark before using the Active Pharmaceutical Ingredients. In addition, precautions needed for the specific Active Pharmaceutical Ingredients are described.

Warning: Active Pharmaceutical Ingredients which have been stored improperly or are too old can be harmful to health.

Guide til:

Fortegnelse og kontroldokument lægemiddelstoffer.

Publikationen indeholder en fortegnelse over de lægemiddelstoffer, der skal være ombord.

Rækkerne

Lægemiddelstofferne er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle smertestillende lægemiddelstoffer organiseret i gruppe 3.

Kolonnerne

Første kolonne beskriver hvert enkelt lægemiddelstofss nummer. Eksempelvis har morfin nummeret 3.4, hvor tallet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter refererer til det specifikke lægemiddelstof. Lægemiddelstofferne i skibets hospital skal så vidt muligt organiseres efter dette nummersystem

Anden kolonne beskriver ATC koden, et klassifikations system for medicin. Se mere på www.whooc.no

Tredje kolonne beskriver lægemiddelstoffet.

Bemærkning: Efter lægemiddelstoffet kan være anført et "Δ", dersom produktet er sløvende, og et "K", dersom produktet skal opbevares i køleskab.

Fjerde kolonne beskriver under "Adm.form", om lægemiddelstoffet skal findes som kapsel, tablet, suppositorier, injektionsvæske, infusionsvæske, creme, salve, afdelte pulver, mund spray, brusetablet, klyksma, oral opløsning eller inhalation.

Femte kolonne beskriver styrken pr tablet eller pr. ml.

Sjette kolonne beskriver mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

Syvende kolonne MFAG B beskriver det supplement, skibet skal medbringe, dersom det sejler med farligt gods jf. IMDG koden.

Bemærkning: Kolonnerne mærket MFAG beskriver de minimumsmængder af supplerende lægemiddelstoffer som skibet skal medbringe, dersom skibet sejler med farligt gods.

Besætningens medbragte medicin

Besætningen har ret til at medbringe egen medicin under den forudsætning, at de til stadighed har en gyldig helbredsundersøgelse for søfarende og fiskere. Medbragte lægemidler skal oplyses til skibsføreren eller sygdomsbehandleren. Lægemidlet skal indskrives med følgende oplysninger:

- Lægemidlets navn
- Navn på besætningsmedlem
- Mængde og antal
- Daglig dosis
- Dato ind
- Eventuel kvittering for modtagelsen. (Kun hvis lægemidlet opbevares på sygelukafet)
- Dato ud
- Kvittering for modtagelsen (Kun hvis lægemidlet har været opbevaret på sygelukafet)

Guide to:

Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients.

The publication contains an inventory of mandatory Active Pharmaceutical Ingredients on board.

The rows

The Active Pharmaceutical Ingredients are organized into main groups according to field of application. As an example all analgesics are organized in group 3.

The columns

First column describes each individual Active Pharmaceutical Ingredient by number. For example, morphine number 3.4, where the number before the dot refers to the main group and the number after the dot refers to the specific Active Pharmaceutical Ingredients. The Active Pharmaceutical Ingredients in the ship's hospital must as far as possible be organized after this numbering system.

Second column describe the ATC code, a classification system on medicine. See more on www.whooc.no.

Third column describes the Active Pharmaceutical Ingredients.

Note: The Active Pharmaceutical Ingredients can be marked with a "Δ" if the product is sedative and a "R" if the product should be stored in a refrigerator.

Fourth column describes under "Adm.form" whether the Active Pharmaceutical Ingredients should be available as capsules, tablets, suppositories injection liquid, infusion liquid, lotion, ointment, divisional powder, mouth spray, effervescent tablets, enema, oral solution or inhalation.

Fifth column describes the strength per tablet or per ml.

Sixth column describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry greater amounts than described.

Seventh column MFAG B describes the supplement the ship must bring if it sails with dangerous goods cf. IMDG code.

Note: The columns marked MFAG describes the minimum quantities of additional (supplement) active pharmaceutical ingredients the ship must bring, if the ship is carrying dangerous goods.

Private medicine of crewmembers

The crew has a right to bring there own medicine, provided they possess a valid health certificate for seafarers and fishermen at all time. The master or the person in charge of medical care has to be informed about medicine brought along.

The medicine must be registreted with the following information:

- Name of the medicine
- Name of crewmember
- Amount
- Daily dosage
- Date in
- Possible receipt for recieved medicine.
(Only if the medicine is stored at the sickbay)
- Date out
- Sign when medicine is returned (Only if the medicine has been stored in the sickbay)

Guide til:

Fortegnelse og kontroldokument medicinsk udstyr.

Publikationen indeholder en fortegnelse over det medicinske udstyr, der skal være om bord.

Rækkerne

Det medicinske udstyr er organiseret i hovedgrupper efter deres hovedanvendelsesområde. Eksempelvis er alle forbindinger og plastre organiseret i gruppe B.

Første kolonne beskriver det enkelte medicinske udstyrs bogstav og nummer. Eksempelvis har "Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4 m", kombinationen nummeret B.9, hvor bogstavet før punktum referer til hovedgruppen, og tallet efter referer til det specifikke medicinske udstyr.

Anden kolonne beskriver det specifikke medicinske udstyr.

Tredje kolonne beskriver den mindste mængde, skibet skal medbringe. Skibet må gerne medbringe større mængder end det beskrevne.

Fjerde kolonne MFAG B beskriver det supplement, skibet skal medbringe, dersom det sejler med farligt gods jf. IMDG koden.

Bemærkning: Kolonnen mærket MFAG beskriver de minimumsmængder af supplerende medicinsk udstyr som skibet skal medbringe, dersom skibet sejler med farligt gods.

Det mobile genoplivningsudstyr A.1

Søfartsstyrelsen har fastsat regler om ilt og det mobile genoplivningsudstyr i gældende Meddelelser A kapitel IX B. Man kan derudover pakke førstehjælpsudstyr og lægemidler til førstehjælp sammen med det mobile genoplivningsudstyr. Der er udarbejdet forslag til pakning af et mobilt genoplivningsudstyr på www.sofartsstyrelsen.dk.

Etiketter

Publikationen indeholder en kopi af de etiketter, der skal være på lægemiddelstofferne ved leveringen. Kopien kan anvendes som kontrol af, at lægemidlet er korrekt og påført den korrekte etiket. Er det ikke tilfældet, bør skibsførerens retlede sin leverandør.

Ved køb af lægemiddelstoffer, kan en kopi af etiketterne afleveres ved leverandøren. Derefter skal leverandøren, før udlevering, påføre de korrekte etiketter.

Indeks

Indekset henviser til lægemiddelstoffernes brugervejledning. I indekset kan du søge på visse sygdomme, symptomer og alle lægemiddelstoffer.

Rekvisation

I publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemiddelstof og medicinsk udstyr.

Medicinkiste- / Mobilt genoplivningsudstyr certifikat.

Mindst en gang årligt skal skibets lægemiddelstoffer og medicinske udstyr gennemgås.

Det mobile genoplivnings udstyr skal kontrolleres hver 3 måned.

Ved gennemgangen kontrolleres mængden, opbevaringsforhold, udløbsdato og etiketter. Nåle, kanyler og metalinstrumenter kontrolleres for rust. Kontroller, at emballagen er intakt. Vær opmærksom på, at lægemiddelstof og medicinsk udstyr skal opbevares tørt og mørkt, og ikke må opbevares i nærheden af klor.

Guide to:

Inventory and Control Document of Medical Equipment.

The publication contains an inventory of the mandatory medical equipment onboard

The rows

The medical equipment is organized into main groups according to their main field of application. For example all dressings and plasters are organized in group B.

First column describes each individual medical equipment by number. The "elastic gauze", approx. 4 cm x 4 m, carries the combination B.9. The letters before the dot refers to the main group, and the number after the dot refers to the specific medical equipment.

Second column describes the specific medical equipment.

Third column describes the minimum amount the vessel must carry. The vessel may carry larger quantities than described.

Fourth column MFAG B describes the supplement the ship must bring if it sails with dangerous goods cf. IMDG Code.

Note: The columns marked MFAG describes the minimum quantities of additional (supplement) medical equipment the ship must bring, if the ship is carrying dangerous goods.

The Mobile Resuscitation Equipment A.1

The Danish Maritime Authority has established rules for oxygen and the mobile resuscitation equipment in the current Notice A chapter IX B. In addition you may pack equipment and medicine suited for first aid with the resuscitation equipment. Suggestions for the list may be found on www.dma.dk.

Labels

The publication contains copies of the labels that must be on each active pharmaceutical ingredient, at the time of delivery. The copy may be used as verification of proper product and label. If labelling is incorrect, the master should guide his supplier.

When purchasing Active Pharmaceutical Ingredients a copy of the label may be delivered to the supplier. Then the supplier applies the correct labels before delivery.

Index

The index refers to the user instruction of active pharmaceutical ingredients. You can search for diseases, symptoms and Active Pharmaceutical Ingredients in the index.

Requisition

I publikationen findes en bestillingsliste, hvor du blot udfylder de ønskede mængder af lægemiddelstof og medicinsk

Medicine chest- / Mobile resuscitation equipment certificate.

At least once a year the ship's Active Pharmaceutical Ingredients and medical equipment must be reviewed. The mobile resuscitation equipment every 3 month.

When reviewing the quantities, storage conditions, expiry date and labels are controlled. Needles, cannulas and metal instruments are checked for rust. Check if the packaging is intact. Be aware that the Active Pharmaceutical Ingredients and equipment must be stored dry and dark, and not near chlorine.

Documentation of 3 months and annual inspection.

On page 2 and 3 is Medicine chest- and mobile resuscitation equipment's certificate's, it can be used to document the inspections. The page's has to be printed and the Master has to sign them.

Dokumentation af 3 måneders og årlig inspektion.

På side 2 og 3 er Medicinkiste – og mobilt genoplivningsudstyrs certifikat, som også kan anvendes til dokumentation af inspektionerne. Siderne udskrives og underskrives af skibsføreren.

Dispensation for andet lægemiddelstof

Det er ikke til alle tider, og i alle lande muligt at indkøbe det foretrukne lægemiddelstof. Den danske Søfartsstyrelse og Radio Medical Denmark har derfor udarbejdet en liste med godkendte alternativer. Hvis det er muligt at indkøbe lægemiddelstoffer fra listen med godkendte alternativer med den korrekte koncentration, og indgiftsmåde, er det ikke nødvendigt at ansøge om dispensation.

Hvis apotek/forhandler tilbyder lægemiddelstof, som ikke findes på nogen liste, skal der søges om dispensation for anden medicin. Dette gøres på Søfartsstyrelsen hjemmeside, hvor der er en procedure for "Dispensation for anden medicin".

Listen over godkendte alternative, og dertil hørende labels og brugervejledninger kan downloades fra www.sofartsstyrelsen.dk.

Listen med godkendte alternativer findes i Excel format.

Hjælp

Er der noget du er i tvivl om, står Søfartsstyrelsen Center for det Maritime Sundhedsvæsen til din rådighed. Adressen er:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø
Telefon: +45 7219 6004
Email: cms@dma.dk

Exemption for other active pharmaceutical ingredients

It is not at all times and in all countries possible to purchase the preferred Active Pharmaceutical Ingredients. The Danish Maritime Authority and Radio Medical Denmark have therefore drawn up a list of approved alternatives. If it is possible to purchase Active Pharmaceutical Ingredients from the list of approved alternatives with the correct concentration and method of administration, it is not necessary to apply for exemption.

If the pharmacy/retailer offer Active Pharmaceutical Ingredients that is not on the inventory- or alternative list, you must apply for an exemption. This is done on the DMA website, where there is a procedure for "exemption of medicine".

The list of approved alternative, and associated labels and user instructions can be downloaded from www.dma.dk.

The list of approved alternatives is available in Excel format.

Help

If you have any questions, the Danish Maritime Authority's Centre of Maritime Health Service is at your disposal. The address is:

CMS, Vestervejen 1, 6720 Fanø
Telephone: +45 7219 6004
E-mail: cms@dma.dk

Anvendte forkortelser m.v. i Fortegnelse og Brugervejledning

afd. Pul.	=	afdelte pulvere
gel	=	gel til påsmøring på hud
htgl.	=	hætteglas
i.m.	=	intramuskulært = i musklen
inf. Væs.	=	infusionsvæske (til intravenøs brug)
inh. Pul.	=	inhalationspulver
inj.Væske	=	injektionsvæske (til i.m. eller s.c.injektion)
i.v.	=	intravenøst = i en vene
"K"	=	opbevares i køleskab
klysma	=	klysma til anvendelse i endetarmen
linim.	=	liniment
gas	=	luftformig gasart til medicinsk anvendelse
mixtur	=	væske som drikkes
næsedr.	=	næsedråber
opløsn.	=	opløsning
s.c.	=	subcutant = under huden
supp.	=	suppositorier = stikpille til brug i endetarmen
Δ	=	sløvende medicin, kan påvirke evnen til maskinbetjening og vagttjeneste
π	=	Receptpligtig medicin

Used abbreviations etc. In the Inventory and User instruction

d.p.	=	divisional powder
gel	=	gel for application on the skin
c.v	=	cappedvials
i.m.	=	intramuscular = in the muscle
inf.fl.	=	infusion fluid (for intravenous use)
inh.p.	=	inhalation powder
inj.subst.	=	injection substance (for reconstitution before use)
inj.liquid	=	injection fluid (for i.m. or s.c. injection)
i.v.	=	intravenous = in a vein
"R"	=	stored in refrigerator
enema	=	enema for use in the rectum
linim.	=	liniment
gas.	=	gas for medical use
mixture	=	drinkable liquid
nose d.	=	nose drops
diss.	=	dissolution
s.c.	=	subcutaneous = under the skin
supp.	=	suppositories = suppository for rectal use
Δ	=	sedative medicine, may effect the ability to operate machinery and bridge duty
π	=	Prescription drugs

Brugervejledning Lægemiddelstoffer

**User instruction Active Pharmaceutical
Ingredients**

Grp. 1 Ilt / Oxygen

Bevidstløs uden vejrtrækning Bevidstløs med vejrtrækning Medtaget almen tilstand Slag mod kraniet Større kvæstelser Vejrtrækningsbesvær MFAG tabel 2, 3, 5, 9, 11	1.1+1.3	Lægemiddelstof:	Medicinsk ilt
		Form:	Luft på trykflasker.
		Virkning:	Tilfører ilt til cellerne via de røde blodlegemer.
		Dosering:	Bevidstløse uden vejrtrækning: Manuel ventilation med 15 liter per minut. Bevidstløse med vejrtrækning og øvrige tilstande: Maske med 9 liter/min.
		Bivirkninger:	Ilt er ufarligt til medicinsk brug.
		Holdbarhed:	Flaske: 3 år fra produktionsdato (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA).
		Opbevaring	Holdes væk fra brandbare gasser og stoffer. Flasker holdes under 50°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Unconscious without breathing Unconscious with breathing Weak general condition Blows to the skull Severe injuries Breathing difficulties MFAG table 2, 3, 5, 9, 11	1.1+1.3	Active Pharmaceutical ingredients:	Medical oxygen
		Form:	Gas in pressurized bottles.
		Effect:	Induces oxygen to the cells via the red blood cells.
		Dosage:	Unconscious without breathing: Manual ventilation, 15 litres per minute (A.1). Unconscious with breathing and other states: Oxygen mask 9 litres per minute.
		Side-effects:	Oxygen is not dangerous when used for medicinal purposes.
		Validity:	Bottles 3 years from productions date (Conoxia®, Linde Gas Therapeutics AGA).
		Storage:	Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50° C.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetics

Lokalbedøvelse Syning af sår	2.1	Lægemiddelstof:	Lidocain
		Form:	Injektionsvæske 10 mg/ml til subcutan injektion.
		Virkning:	Lokalbedøver på injektionsstedet. Virker efter 1 - 2 minutter. Virker i 2 - 3 timer.
		Dosering:	Mængden afhænger af sårets størrelse. Normalt anvendes 20 - 50 mg. Maksimaldosis er 20 ml svarende til 200 mg. Se Søfartsstyrelsens Lægebog.
		Bivirkninger:	Allergi er sjælden. Ved utilsigtet injektion i blodbanen kan der opstå: 1. føleforstyrrelser, svimmelhed, uklarhed og øresusen. 2. synsforstyrrelser, muskelrysten og kramper. 3. blodtryksfald og langsom puls.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Må ikke fryses.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Lokalbedøvelse skal ske i et rum med adgang til adrenalin (4.1) og genoplivningsudstyr (A.1). Risiko for alvorlige bivirkninger, hvis lidocain injiceres i blodbanen.

Local anaesthetics Suture of wounds	2.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Lidocaine
		Form:	Injection liquid, 10 mg/ml for subcutaneous injection.
		Effect:	Anaesthetises the place of injection. Takes effect after 1-2 minutes. Effective for 2-3 hours.
		Dosage:	The amount depends on the size of the wound. Normally, 20-50 mg is used. The maximum dose is 20 ml, equivalent to 200 mg. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual.
		Side-effects:	Allergy seldom occurs. In case of an unintended injection into the bloodstream, the following side-effects may occur: 1. affective disturbances, dizziness, confusion, and buzzing in the ears, 2. visual disturbances, muscle contractions, and convulsions, 3. falling blood pressure and slow pulse.
		Validity:	3 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature. Not to be frozen.
Lokalbedøvelse Kløestillende	2.2	Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Local anaesthetics must be administered in a room with access to adrenaline (4.1) and resuscitation equipment (A.1). Risk of serious side-effects if lidocaine is injected directly into the bloodstream.
		Lægemiddelstof:	Lidocain
		Form:	Gel, 20 mg/g (2%).
		Virkning:	Lokalbedøver hud og sårrende. Kløestillende.
		Dosering:	Anvendes som lokalbedøvelse ved smertende sår eller smertefulde procedurer, fx ved rengøring af brandsår eller større og forurenede sår. Et tykt lag gel påsmøres huden, der herefter afdækkes lufttæt i ca. 15 minutter. Virker efter ca. 15 minutter. Virker i ca. 30 minutter.
		Bivirkninger:	Allergi er sjælden.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Xylocain®, AstraZeneca).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
Local anaesthetics Relieves itching	2.2	Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
		Active Pharmaceutical ingredients:	Lidocaine
		Form:	Gel, 20 mg/g (2%).
		Effect:	Anaesthetises the skin and the edges of wounds. Relieves itching.
		Dosage:	To be used as local anaesthetics in case of painful wounds or procedures, e.g. cleansing of burns or large, dirty wounds. A thick layer is applied to the skin, which is subsequently covered in an air-proof condition for about 15 minutes. Takes effect after about 15 minutes. Effective for about 30 minutes.
		Side-effects:	Allergy seldom occurs.
		Validity:	2 years from the date of production (Xylocain®, AstraZeneca).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 3 Smertestillende midler / Analgetics

Feber Svage smerter: Hovedpine Muskelsmerter Ledsmerter Rygsmarter MFAG tabeller: 7, 8, 13	3.1	Lægemiddelstof:	Paracetamol
		Form:	Tabletter à 500 mg.
		Virkning:	Febernedsættende og smertestillende.
		Dosering:	Voksne: 1 g 3 - 4 gange dagligt. Højst 4 g per døgn.
		Bivirkninger:	Doser over 15 - 20 g indebærer risiko for leverskade, leversvigt og død.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Pamol Nycomed DK ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Ingen.
Fever Weak pains: Headache Muscle pains Pain in joints Back pains MFAG tables: 7, 8, 13	3.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Paracetamol
		Form:	Tablets of 500 mg.
		Effect:	Pain relieving and reduces fever.
		Dosage:	Adults: 1 g three-four times daily. Not more than 4 g daily.
		Side-effects:	Doses of more than 15-20 g involve liver damage, liver failure, and death.
		Validity:	5 years from the date of production (Pamol Nycomed DK ApS).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	None
Moderate smerter: Menstruationssmerter Ledsmerter Knoglesmerter Knoglebrud Muskelsmerter	3.2	Lægemiddelstof:	Ibuprofen
		Form:	Tabletter à 400 mg.
		Virkning:	Smertestillende og febernedsættende.
		Dosering:	Voksne: 400 mg 3 - 4 gange dagligt. Højst 1800 mg per døgn. Undtagelsesvist op til 2400 mg per døgn i kortere perioder (4 - 6 uger).
		Bivirkninger:	Ondt i maven.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Ibumetin®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Bør ikke anvendes ved: 1. allergi for acetylsalicylsyre. 2. astmapatienter. 3. patienter i blodfortyndende behandling. 4. patienter med symptomer på mavesår.

Grp. 3 Smertestillende midler
(continued)

Moderate pains: Period pains Pain in joints Bone-ache Fractures Muscle pains	3.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Ibuprofen
		Form:	Tablets of 400 mg.
		Effect:	Pain relieving and reduces fever.
		Dosage:	Adults: 400 mg three-four times daily. Not more than 1800 mg daily. Exceptionally, up to 2400 mg daily for shorter periods of time (4-6 weeks).
		Side-effects:	Stomach ache.
		Validity:	5 years from the date of production (Ibumetin®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> Not to be used in case of: 1. allergy to acetylsalicylic acid. 2. asthma patients. 3. patients in blood diluting treatment. 4. patients with symptoms of ulcer.
Stærke smerter: Store sårskader Kvæstelser Forbrændinger Knoglebrud Nyresten Galdesten Blodprop i hjertet (se førstehjælp under 9.1 Nitroglycerin) MFAG tabel 7, 8,10,13	3.4	Lægemiddelstof:	Morfin Δ
		Form:	Injektionsvæske 10 mg/ml, ampuller à 1 ml.
		Virkning:	Smertestillende. Vækker velvære, virker afslappende. Virker efter 5 – 15 min ved intramuskulær (i.m.) eller subcutan (s.c.) injektion. Virker omgående ved intravenøs (i.v.) injektion. Virkningsvarighed: 3 -4 timer.
		Dosering:	Subcutant og intramuskulært (voksne) 10 mg. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver. Intravenøst (voksne): 5 mg (halv ampul) injiceres langsomt. Kan gentages, hvis tilstrækkelig effekt udebliver.
		Bivirkninger:	Svækker vejtrækningen. Kvalme og opkastning. Hæmmer optagelsen af medikamenter fra mavesækken. Kan give forstoppelse og hæmme blæretømningen.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato, (Morfin, Skanderborg apotek).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved overdosering kan vejtrækningen ophøre. Modgift: Naloxone (5.1). Denne bivirkning og morfins virkning i øvrigt forstærkes af andre beroligende stoffer som alkohol, sovemidler og lignende. Overdosering er især en risiko ved hurtig injektion. Overdosering sker sjældent ved almindelig dosering. Observer vejtrækningen og ventilere om nødvendigt med ilt (1.1) på ventilationspose og maske (A.1).

Severe pain Major wounds Injuries Burns Fractures Kidney stone Gall stone Coronary thrombosis (see first aid under 9.1 Glyceryl trinitrate) MFAG Tabel 7,8,10,13	3.4	Active pharmaceutical ingredients:	Morphine Δ
		Form:	Injection liquid, 10 mg/ml, ampoules of 1 ml.
		Effect:	Pain relieving. Gives the patient a feeling of well-being, relaxant. Takes effect after about 5-15 minutes in case of intramuscular or subcutaneous injection. Takes effect immediately in case of intravenous injection Effective for 3-4 hours.
		Dosage:	Subcutaneously and intramuscularly (adults): 10 mg. May be repeated if the effect is not sufficient. Intravenously (adults): 5 mg (1/2 ampoule) to be injected slowly. May be repeated if the effect is not sufficient.
		Side-effects:	Restricts breathing. Nausea and vomiting. Restricts the absorption of medicaments from the stomach. May cause constipation and restrict bladder emptying.
		Validity:	2 years from the date of production (Morphine, Skanderborg Pharmacy).
		Storage:	Normal temperature. To be protected from light.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of an overdose, the patient may stop breathing. Antidote: Naloxone (5.1). This side-effect and the effect of morphine as drowsiness may be increased by the use of other sedatives, such as alcohol, sleeping medicine, ect. Risk of overdose primarily if the injection is given too quickly. Overdoses are rare in case of normal dosage. Observe the breathing and if necessary, ventilate by means of oxygen (1.1) ventilations bag and mask (A.1).
Stærke smerter	3.9	Lægemiddelstof	Morphine hydroclorid Δ
		Form:	Tablet á 10 mg
		Virkning:	Smertestillende
		Dosering:	10 – 30 mg hver 4 time
		Bivirkninger:	Kvalme, forstoppelse, opkastning, feber, humørsvingninger og lavt blodtryk. Svimmelhed, hallucinationer, nedsat verjtrækning og mavesmerter
		Holdbarhed:	4 år fra produktionsdato (Morfin, EQL Pharma AB)
		Opbevaring:	Normal temperatur. Dog under 25 °C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Severe pain	3.9	Active Pharmaceutical Ingredients:	Morphinehydrochloride Δ
		Form:	Tablets á 10 mg
		Effect:	Pain relieving
		Dosage:	10 – 30 mg every 4 hours
		Side-effects:	Nausea, constipation, vomiting, fever, mood swings and low blood pressure. Dizziness, hallucinations, decreased circulation and abdominal pain
		Validity:	4 years from production date (Morphine, EQL Pharma AB)
		Storage:	Normale temperature – not above 25°C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge

Allergisk shock	4.1	Lægemiddelstof:	Adrenalin
		Form:	Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Øger pulsen, hjertets pumpekraft og blodtrykket. Sammentrækning af blodkar. Virker 2 - 5 minutter efter intramuskulær injektion. Omsættes meget hurtigt. Halveringstiden i blodet er 2 - 3 minutter.
		Dosering:	Omgående (voksne): 0,6 mg (godt en halv ampul) dybt intramuskulært. Kan eventuelt gentages, hvis virkningen udebliver.
		Bivirkninger:	Blodtryksstigning, hurtig puls, rysten og svimmelhed.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Adrenalin®, 2care4),
		Opbevaring:	Læs indlægsseddel
		Anmærkninger:	Søg råd med <i>Radio Medical</i> . Er livsfarligt at anvende ved shock forårsaget af blod- eller væsketab.
Allergic shock	4.1	Active pharmaceutical ingredients:	Epinephrine.
		Form:	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Increases the pulse, the pumping power of the heart, and the blood pressure. Contraction of blood vessels. Takes effect 2-5 minutes after intramuscular injection. Transformed very quickly. The half-life in the blood is 2-3 minutes.
		Dosage:	Immediately (adults): 0.6 mg (about half an ampoule) given deep intramuscular. May be repeated if the effect is insufficient.
		Side-effects:	High blood pressure, rapid pulse, shivering, and dizziness.
		Validity:	2 years from the date of production (Adrenalin®, 2care4)
		Storage:	Read packet insert
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Potentially fatal if used to treat shock caused by loss of blood or fluid.

Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge
(continued)

Allergi Høfeber Nældefeber Allergisk ansigtsødem Allergisk astma	4.2	Lægemiddelstof:	Acrivastin
		Form:	Kapsler à 8 mg.
		Virkning:	Modvirker allergi. Maksimal virkning efter 1½-2 timer. Virkningsvarighed op til 8 timer.
		Dosering:	Voksne: 8 mg efter behov. Maksimalt 3 gange per døgn.
		Bivirkninger:	Døsighed kan forekomme og forstærkes af alkohol og beroligende midler, herunder sovemidler.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Benadryl®, McNeil ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg råd med <i>Radio Medical</i> . Lægemidlet er ikke mærket med Δ men enkelte personer sløves alligevel så meget, at det er uforsvarligt med vagttjeneste eller maskinbetjening. Ved lugesymptomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Hay fever Urticaria Allergic face oedema Allergic asthma	4.2	Active pharmaceutical ingredients:	Acrivastine
		Form:	Capsule of 8 mg.
		Effect:	Eases allergic symptoms. Maximum effect after 1.5-2 hours. Effective for up to 8 hours.
		Dosage:	Adults: 8 mg when required. Maximum three times daily.
		Side-effects:	Drowsiness may occur and is increased by the use of alcohol and sedatives, including sleeping medicine.
		Validity:	3 years from the date of production (Benadryl®, McNeil Denmark ApS).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . The medicament is not marked with a Δ , but some patients experience a high degree of drowsiness, making bridge duty and operations of machinery unsafe. In case of symptoms of from the lungs: See group 15.

Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge

(continued)

Allergi Allergisk astma Allergisk ansigtsødem	4.3	Lægemiddelstof:	Hydrocortison
		Form:	Injektionssubstans 100 mg i to-delt hætteglas med 2 ml sterilt vand til intramuskulært eller intravenøst brug.
		Virkning:	Modvirker allergi og inflammationer. Virkningen indtræder først 4 - 6 timer efter injektion, hvorfor anden akut behandling skal dække dette tidsrum.
		Dosering:	Voksne: 100 mg intramuskulært eller intravenøst som éngangsdosis.
		Bivirkninger:	Ved længere tids anvendelse: Forstyrrelser i sukker, vand- og saltstofskiftet og i kirtlernes funktion. Sløring og/eller aktivering af infektioner. Eufori, sindssyge og søvnløshed. Ondt i maven og mavesår.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Brugsfærdig injektionsvæske holdbart i 72 timer, hvis opbevaret i køleskab.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod lys.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved lugesymptomer: Se tillige gruppe 15.
Allergy Allergic asthma Allergic face oedema	4.3	Active pharmaceutical ingredients:	Hydrocortisonsuccinate
		Form:	Injection substance, 100 mg in capped vial divided into two sections, with 2 ml sterile water for intramuscular or intravenous use.
		Effect:	Eases symptoms of allergy and inflammations. Does not take effect until 4-6 hours after the injection. Other acute treatment to cover this period is needed.
		Dosage:	Adults: 100 mg given intramuscularly or intravenously as a single dose.
		Side-effects:	If used for a extended period: Disturbances in the sugar, water and salt metabolism and in the glandula functions. Masking and/or activation of infections. Euphoria, mental illness and insomnia. Stomache ache and ulcer.
		Validity:	5 years from the date of production (Solu-Cortef®, Pfizer ApS). Injection liquid ready for use, valid for 72 hours, if stored cold.
		Storage:	Normal temperature. To be kept out of daylight. Injection liquid ready for use, to be stored refrigerated.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of symptoms from lungs See also group 15.

Grp. 4 Midler mod allergi, shock og søsyge
(continued)

Søsyge	4.7	Lægemiddelstof:	Cyclizin Δ
		Form:	Table á 50 mg
		Virkning:	Modvirker søsyge
		Dosering:	50 mg, 1-2 timer før ønsket effekt. Højest 3 doser pr. døgn
		Bivirkninger:	Sløret syn, Døsighed
		Holdbarhed:	3 år fra produktiondato (Marzine, Viatris ApS)
		Opbevaring:	Normal temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med Radio Medical
Seasickness	4.7	Active pharmaceutical ingredients:	Cyclizine Δ
		Form:	Tablets of 50 mg
		Effect:	Prevent seasickness
		Dosage:	50 mg 1-2 hours before effect. Maximum 3 dosage pr. 24 hours
		Side-effects:	Blurred vision, drowsiness
		Validity:	3 years from production date (Marzine, Viatris ApS)
		Storage:	Normale temperature
		Remarks:	Consult Radio Medical

Grp. 5 Antidoter / Antidotes

Modgift ved overdosering af morfin MFAG tabel 4, 13 Førstehjælp: Ved udsættende vejtrækning understøttes manuelt med ilt på ballon og maske 15 l/ilt/minut	5.1	Lægemiddelstof:	Naloxon
		Form:	Injektionsvæske 0,4 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Naloxon ophæver morfins (bi)virkning. Virker 2 - 3 minutter efter intramuskulær injektion. Virkningsvarighed: Op til 4 timer.
		Dosering:	1. Naloxon voksne: Der gives omgående 0,8 mg (2 ampuller) intramuskulært. 2. Hvis virkningen udebliver kan behandlingen gentages efter 5 minutter.
		Bivirkninger:	Rysten, utilpashed og opkastninger (abstinenssymptomer).
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Naloxon, B. Braun).
		Opbevaring:	Beskyttes mod lys.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Antidote to be administered in case of an overdose of morphine MFAG table 4, 13 First Aid: If the patient stops breathing, assist breathing manually with oxygen 15l/minute on a mask	5.1	Active pharmaceutical ingredients:	Naloxone
		Form:	Injection liquid, 0.4 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Naloxone counteracts the (side)-effects of morphine. Takes effect 2-3 minutes after intramuscular injection. Effective for up to 4 hours.
		Dosage:	1. Naloxone adults: 0.8 mg (2 ampoules) is given immediately intramuscular. 2. In case of no effect, the treatment may be repeated after 5 minutes.
		Side-effects:	Shivering, feeling unwell, and vomiting.
		Validity:	3 years from the date of production (Naloxon B. Braun).
		Storage:	To be protected from daylight.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Insulintilfælde Insulinshock Lavt blodsukker	5.2	Lægemiddelstof:	Glucagon
		Form:	Ready-set bestående af: Injektionssubstans Glucagon 1 mg i hætteglas og sprøjte med 1 ml sterilt vand til intramuskulært brug.
		Virkning:	Frigør sukkerreserver fra leveren. Virker normalt inden 5 - 10 minutter. Virkningsvarighed: 10 - 40 minutter.
		Dosering:	Voksne: 1 mg intramuskulært. Kan evt. gentages efter 10 - 15 minutter. Når patienten er kommet til bevidsthed gives brød og sød saft.
		Bivirkninger:	Kvalme og opkastninger kan forekomme. Kan udløse hjertekrampe hos hjertesygge. Hjertekrampe behandles med glycerylnitrat spray (9.1).
		Holdbarhed:	Ved almindelig temperatur: 18 måneder fra produktionsdato (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). Ved 2-8°C: 36 måneder fra produktionsdato. Den blandede opløsning skal anvendes umiddelbart.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur eller 2-8°C (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Dersom den blandede opløsning er uklar eller med krystaller, må blandingen ikke anvendes.
Hypoglycaemic coma Insulin shock Low blood sugar	5.2	Active pharmaceutical ingredients:	Glucagon
		Form:	Ready-set consisting of: Injection substance Glucagon, 1 mg in a capped vial and a syringe with 1 ml of sterile water for intramuscular use.
		Effect:	Releases sugar reserves from the liver. Normally, takes effect within 5-10 minutes. Effective for 10-40 minutes.
		Dosage:	Adults: 1 mg intramuscularly. May be repeated after 10-15 minutes. When the patient regains consciousness, he is given some bread and sweet juice.
		Side-effects:	Nausea and vomiting may occur. May cause angina pectoris in people with heart diseases. Angina pectoris is treated with glyceryl trinitrate spray (9.1).
		Validity:	At room temperature: 18 months from the date of production (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk). At 2-8°C: 36 months from the date of production. The mixed dissolution must be used immediately.
		Storage:	Normal temperature or 2-8°C (GlucaGen® HypoKit, Novo Nordisk).
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . If the mixed dissolution is cloudy or contains crystals, it must not be used.

MFAG tabel 17 Forgiftninger med insektgifte, der indeholder organophosphater eller carbamater	5.3	Lægemiddelstof:	Atropin
		Form:	Injektionsvæske 1 mg/ml, ampuller à 1 ml til intravenøs injektion.
		Virkning:	Livreddende ved forgiftninger af visse insektgifte. Virkningen afhænger af gifttype og mængde. Se MFAG tabel 17.
		Dosering:	Dosis afhænger af forgiftningen. Atropin indgives langsomt intravenøst. Der startes med 2 mg (2 ampuller) og fortsættes med yderligere 2 mg efter hver 5-10 minutters mellemrum indtil pupillerne begynder at udvide sig. Giftig dosis er 10 - 20 mg til voksne. Dødelig dosis er ca. 200 mg til voksne.
		Bivirkninger:	Pupiludvidelse, lysskyhed, tørre slimhinder, hurtig puls, vandladningsbesvær og forstoppelse.
		Holdbarhed:	Plastampuller: 2 år fra produktionsdato (Atropin®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 17 Poisoning with insecticides containing organophosphates or carbamates	5.3	Active pharmaceutical ingredients:	Atropin
		Form:	Injection liquid, 1 mg/ml, ampoules of 1 ml for intravenous injection.
		Effect:	Life-saving in connection with poisonings caused by certain insecticides. The effect depends on the type and amount of poison. See MFAG table 17.
		Dosage:	The dose depends on the poisoning. Atropin is given slowly intravenously. At first, 2 mg (2 ampoules) is given, followed by another 2 mg after every 5-10 minutes until the pupils start dialating. Poisonous dose is 10-20 mg for adults. Lethal dose is about 200 mg for adults.
		Side-effects:	Dilation of the pupils, photophobia, dry mucous membranes, rapid pulse, dysuria and constipation.
		Validity:	Plastic ampoules: 2 years from the date of production (Atropin®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
MFAG tabel 8, 16 Ætsninger med fluorholdige salte og syrer	5.4	Lægemiddelstof:	Calciumgluconat 2%.
		Form:	Tuber à 25 g, indeholdende 2 g calciumgluconat per 100 g. Fremstilles af apoteket.
		Virkning:	Calcium neutraliserer i et vist omfang ætsningsskaderne ved fluoridætsninger.
		Dosering:	Huden indsmøres i calciumgluconat gel. Se vejledning i MFAG tabel 8 og 16.
		Bivirkninger:	Ingen.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

MFAG table 8, 16 Caustic burns caused by salts and acids containing fluorine	5.4	Active pharmaceutical ingredients:	Calciumgluconate 2%.
		Form:	Tubes of 25 g, containing 2 g of calciumgluconate per 100 g. Made by the individual pharmacy.
		Effect:	Calcium neutralizes caustic burns caused by fluorine to some extent.
		Dosage:	Calciumgluconate gel is applied to the skin. See guidelines in MFAG table 8 og 16.
		Side-effects:	None.
		Validity:	2 years from the date of production.
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
MFAG tabel 16 Ætsninger med fluorholdige salte og syrer, der omfatter mere end 1% af hudens overflade	5.5	Lægemiddelstof:	Calciumlactogluconat og calciumcarbonat
		Form:	Brusetabletter à 500 mg.
		Virkning:	Neutraliserer i et vist omfang skader efter optagelse af fluorsalte og fluorid forbindelser gennem huden.
		Dosering:	Ordination af <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Normalt ingen bivirkninger.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Calcium-Sandoz®, Novartis).
		Opbevaring:	Er fugtfølsomt. Opbevares tørt i tæt emballage ved almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 16 Caustic burns caused by salts and acids containing fluorine and covering more than 1% of the surface of the skin	5.5	Active pharmaceutical ingredients:	Calciumlactogluconate and calciumcarbonate
		Form:	Effervescent tablets of 500 mg.
		Effect:	Neutralizes injuries caused by the absorption of fluoride compounds through the skin to some extent.
		Dosage:	Contact <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	No side effects.
		Validity:	3 years from the date of production (Calcium-Sandoz, Orifarm).
		Storage:	Sensitive to humidity. To be stored in a dry place in a sealed packaging at room temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

MFAG tabel 10 Forgiftninger og ætsninger i mave og tarm.	5.6	Lægemiddelstof:	Aktivt kul
		Form:	50 g aktivt kul i granulatform til opblanding i 400 ml vand.
		Virkning:	Opsuger gift og lægemidler fra mavetarmkanalen og binder stofferne til kulpartiklerne.
		Dosering:	50-100 g kul (1 - 2 flasker) opslemmet i vand indtages så hurtigt som muligt. Ved alvorlige forgiftninger fortsættes med 20 g (160 ml) hver 6. time. Se også MFAG, Appendix 14.
		Bivirkninger:	Farver afføringen sort. Kan give forstoppelse. Nedsætter virkningen af lægemidler, der er indtaget via munden.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Carbomix Norit®). Efter opblanding i vand: Maks. 3 dage i køleskab.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg råd med <i>Radio Medical</i> . Anvendes ikke til bevidstløse. Må ikke anvendes ved indtagelse af stærke syrer/baser eller organiske opløsningsmidler (petroleums-lignende).
MFAG table 10 Poisoning and caustic burns in stomach and intestines.	5.6	Active pharmaceutical ingredients:	Active carbon
		Form:	50 g of active carbon in the form of granulate for dilution in 400 ml of water.
		Effect:	Absorbs poison and medicaments from the gastrointestinal tract and binds the substances to the carbon particles.
		Dosage:	50-100 g carbon (1-2 bottles) suspended in water is taken as quickly as possible. In case of serious poisonings, continue with 20 g (160 ml) every sixth hour. See also MFAG, Appendix 14.
		Side-effects:	Black faeces. May cause constipation. Reduces the effect of medicaments taken through the mouth.
		Validity:	5 years from the date of production (Carbomix Norit®). After having been mixed with water, maximum 3 days in the fridge.
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Do not use on unconscious patients. Not to be used in connection with strong acids/bases or organic solvents (kerosene related).

MFAG tabel 19 Forgiftninger med methanol og ethylene glycol	5.7	Lægemiddelstof:	Ethyl alkohol 99,5% (alternativt 99,9%)
		Form:	Væske.
		Virkning:	Modgift mod methanol og ethylenglycols virkning.
		Dosering:	25 ml opblandes i 250 – 300 ml vand eller saft. Dosis gentages hver 3 time indtil evakuering. Se MFAG tabel 19.
		Bivirkninger:	Kvalme, hovedpine.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato.
		Opbevaring:	Almindelig stuetemperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
MFAG table 19 Poisoning caused by methanole and ethylene glycole	5.7	Active pharmaceutical ingredients:	Ethyl alcohol 99,5% (alternative 99,9%)
		Form:	Liquid.
		Effect:	Antidote against the effect of methanole and ethylene glucole.
		Dosage:	25 ml is mixed with 250-300 ml water or juice. Repeat every 3 hours until evacuation. See MFAG table 19.
		Side-effects:	Nausea, vomiting and headache.
		Validity:	2 years from the date of production.
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion

Angst og urotilstande Alkoholabstinenser Forebyggelse af kramper Ledskred og brud 1. valgspræparat ved akut sindssyge (alternativt anvendes klysma (6.3))	6.2	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ
		Form:	Tabletter à 5 mg.
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker efter 30 minutter. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	5 mg x 3 dagligt. Akut sindssyge: Dosis efter aftale med <i>Radio Medical</i> . Se også 6.4.
		Bivirkninger:	Vanedannende. Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Diazepam, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Anxiety and states of restlessness Alcoholic withdrawal symptoms Prevention of convulsions Dislocations and fractures First choice of medicament in case of acute mental disease (alternatively, Enema (6.3) are used.)	6.2	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam Δ
		Form:	Tablets of 5 mg.
		Effect:	Strongly sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect after 30 minutes. Is excreted very slowly (halving time: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	5 mg three times daily. Acute mental disease: Dose after consultation with <i>Radio Medical</i> . See also 6.4.
		Side-effects:	Addictive. Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	5 years from the date of production (Diazepam, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
Universelle kramper Kramper fra forgiftninger Abstinenskramper Epilepsi Akut sindssyge MFAG tabel 4, 5, 6	6.3	Lægemiddelstof:	Diazepam Δ
		Form:	Klysma, 4 mg/ml, til anvendelse i endetarmen.
		Virkning:	Stærkt sløvende og muskelafslappende. Dæmper angst, uro og rastløshed. Virker 5 - 10 minutter efter rektal administration. Udskilles meget langsomt (Halveringstid: 20 - 50 timer). Forstærker virkningen af morfin, haloperidol, alkohol og andre sløvende medikamenter.
		Dosering:	Efter samråd med <i>Radio Medical</i> - 1 klysma tømmes i endetarmen.
		Bivirkninger:	Døsighed, svimmelhed, forvirring, hukommelsessvigt og balanceforstyrrelser.
		Holdbarhed:	2,5 år fra produktionsdato (Stesolid®, Actavis A/S). Dog maksimalt 1 år efter anbrud af aluminiumsposen.
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)

Universal convulsions Convulsions caused by poisoning Withdrawal convulsions Epilepsy Acute mental illness MFAG tabel 4, 5, 6	6.3	Active pharmaceutical ingredients:	Diazepam Δ
		Form:	Enema, 4 mg /ml, for insertion into the rectum.
		Effect:	Strong sedative and muscle-relaxant. Decreases anxiety and restlessness. Takes effect 5-10 minutes after rectal administration. Is excreted very slowly (half-life: 20-50 hours). Increases the effect of morphine, haloperidole, alcohol and other sedatives.
		Dosage:	After consult with Radio Medical - 1 enema emptied into the rectum.
		Side-effects:	Drowsiness, dizziness, confusion, lapse of memory, and balance disturbances.
		Validity:	2,5 years from the date of production (Stesolid®, Actavis A/S). However, maximum 1 year after having opened the aluminiumbag.
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
2. valgspræparat ved akut sindssyge præget af mani, vildskab, psykisk og Motorisk uro, angst, vrangforestillinger og hallucinationer Kvalme og opkastninger	6.4	Lægemiddelstof:	Haloperidol Δ
		Form:	Injektionsvæske 5 mg/ml, ampuller à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Afdæmper symptomerne ved sindssygen. Dæmper kvalme og opkastninger.
		Dosering:	Akut sindssyge: 5 - 10 mg intramuskulært. Kan eventuelt gentages 3 eller flere gange dagligt. Behandlingen kan eventuelt forstærkes med diazepam (6.2/6.3).
		Bivirkninger:	Den sløvende effekt forstærkes af alkohol, morfin og andre sløvende midler.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Serenase®, Janssen-Cilag).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Second choice of medicament in case of acute mental illness characterized by mania, wildness, mental and motoric restlessness, anxiety, delusions, and hallucinations Nausea and vomiting	6.4	Active pharmaceutical ingredients:	Haloperidole Δ
		Form:	Injection liquid 5 mg/ml, ampoules of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Restricts the symptoms of mental disease. Reduces nausea and vomiting.
		Dosage:	Acute mental disease: 5-10 mg intramuscularly. May be repeated three times daily or more. The treatment may be enhanced by the use of diazepam (6.2/6.3).
		Side-effects:	The sedative effect is increased by alcohol, morphine, and other sedatives.
		Validity:	5 years from the date of production (Serenase®, Janssen-Cilag).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 6 Midler mod psykiske lidelser og kramper / Mental disorder and Convulsion (continued)

Søvnløshed Indsovningsbesvær	6.5	Lægemiddelstof:	Zolpidem Δ
		Form:	Tabletter à 10 mg.
		Virkning:	Stærkt sløvende. Virker hurtigt efter indtagelse. Virkningen varer op til 6 timer. Virkningen forstærkes af andre sløvende stoffer, herunder alkohol.
		Dosering:	Voksne. 10 mg 15-30 minutter før sengetid.
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré. Hovedpine, koncentrationsbesvær, konfusion, hukommelsesbesvær, svimmelhed, døsigheid, hudreaktioner, dobbeltsyn.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Zolpidem Hexal A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Insomnia Difficulty falling asleep	6.5	Active pharmaceutical ingredients:	Zolpidem Δ
		Form:	Tablets of 10 mg.
		Effect:	Strong sedative, rapid effect after ingestion, Effective up till 6 hours. The effect is increased by the use of other sedatives, including alcohol.
		Dosage:	Adults. 10 mg 15-30 minutes before bedtime.
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhea. Headache, difficulty concentrating, confusion, memory loss, dizziness, drowsiness, skin reactions, double vision.
		Validity:	5 years from the date of production (Zolpidem Hexal A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections

Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse	7.1	Lægemiddelstof:	Phenoxymethylpenicillin
		Form:	Tabletter à 660 - 800 mg (ca. 1 mill. IE).
		Virkning:	Dræber de hyppigst forekommende bakterier, der forårsager infektioner i luftvejene.
		Dosering:	400 mg – 800 mg × 2 - 4 dagligt.
		Bivirkninger:	Kvalme, diarré og hududslæt. Sjældent ses overfølsomhedsshock.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Primcillin®, MEDA).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsshock optræder meget sjældent, og som regel senest 30 minutter efter indgift. Behandling: Adrenalin 0.6 mg intramuskulært (4.1).
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia	7.1	Active pharmaceutical ingredients:	Phenoxymethylpenicillin
		Form:	Tablets of 660 - 800 mg (approx. 1 MIU).
		Effect:	Kills the most common bacteria causing infections of the respiratory tract.
		Dosage:	400-800 mg × 2-4 times daily.
		Side-effects:	Vomiting, diarrhoea and rash. Rarely allergic shock.
		Validity:	3 years from the date of production (Primcillin®, MEDA).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Allergic shock is very rare and usually occurs within 30 minutes after administration. Treatment: Adrenaline 0.6mg intramuscular (4.1).
MFAG tabel 9 Lungebetændelse efter inhalation af giftige kemiske stoffer	7.2	Lægemiddelstof:	Amoxicillin
		Form:	Kapsler eller tabletter à 500 mg
		Virkning:	Modvirker inflammation
		Dosering:	375-750 mg 2 gange daglig
		Bivirkninger:	Feber, kvalme, opkastning, sure opstød, diarré, hudkløe, hududslæt
		Holdbarhed:	4 år fra produktionsdato (Imadrax, Sandoz A/S)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections				(continued)
MFAG table 9 Pneumonia after inhalation of poisonous chemical substances	7.2	Active Pharmaceutical Ingredients:	Amoxicilline	
		Form:	Capsules or tablets of 500 mg	
		Effect:	Prevent inflammation	
		Dosage:	375-750 mg twice daily	
		Side-effects:	Fever, nausea, vomiting, heartburn, diarrhoea, rash and urticaria, Rarely allergic shock	
		Validity:	4 years from the date of production (Imadrax, Sandoz A/S)	
		Storage:	Normal temperature	
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>	
Halsbyld Tandbyld Knogleinfektion Underlivsinfektioner Tarminfektioner Blindtarmsbetændelse MFAG tabel 10	7.7	Lægemiddelstof:	Metronidazol	
		Form:	Stikpille à 500 mg.	
		Virkning:	Bakteriedræbende.	
		Dosering:	500 mg x 3 daglig.	
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse, og smagsforstyrrelse. Mørkfarvet urin. Kan virke som antabus ved samtidig indtagelse af alkohol.	
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/S).	
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.	
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan om nødvendigt anvendes, til gravide. Anvendes ofte i kombination med andre antibiotika, fx Ciprofloxacin (7.8) eller Ceftriaxon (7.9). Må ikke anvendes sammen med 15.1 Dexofan.	
Boil in the throat Tooth abscess Bone infection Infection of female reproductions organs Abdominal infections Intestinal infections Appendicitis (Check dipstick G.1) MFAG table 10	7.7	Active pharmaceutical ingredients:	Metronidazol	
		Form:	Suppository of 500 mg.	
		Effect:	Kills bacteria.	
		Dosage:	500 mg three times daily.	
		Side-effects:	Nausea vomiting, abdominal pain, diarrhea, constipation, and taste disturbance. Dark colored urine. May cause a reaction similar to Antabuse in connection with alcohol.	
		Validity:	3 years from productions date (Flagyl®, Sanofi-aventis Denmark A/S).	
		Storage:	Normal temperature.	
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . May be used during pregnancy, if nessasary. Often used in combination with other antibiotics e.g. Ciprofloxacin (7.8) or Ceftriaxon (7.9). May not be used with 15.1 Dextromethorphan.	

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections				(continued)
Tandbyld Halsbyld Svær bronkitis Lungepest Akut diarré Kolera Dysenteri Blindtarmsbetændelse Gonoré Urinrørsbetændelse Nyrebækkenbetændelse (tjek urinstiks G.1)	7.8	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin	
		Form:	Tabletter à 250 mg	
		Virkning:	Dræber bakterier.	
		Dosering:	250 - 750 mg x 2 dagligt. Tabletterne gives senest en time før måltid eller tidligst 2 timer efter.	
		Bivirkninger:	Mavekneb, kvalme, opkastninger, madlede, hovedpine, svimmelhed, træthed og kramper, muskel-, led- og seneømhed, allergi, overfølsomhedsreaktion ved samtidig udsættelse for sollys.	
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Cifin, PharmaCoDane ApS).	
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.	
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Gives ved mange infektioner i kombination med metronidazol (7.6 eller 7.7). Må ikke gives til gravide eller ammende.	
		Boil in the throat Tooth abscess Severe bronchitis Pneumonic plague Acute diarrhoea Cholera Dysentery Appendicitis Gonorrhoea Urethritis Pyelitis (Check dipstick G.1)	7.8	Active pharmaceutical ingredients:
Form:	Tablets of 250 mg.			
Effect:	Kills bacteria.			
Dosage:	250-750 mg twice daily. The tablets are given 1 hour before a meal at the latest or			
Side-effects:	Bellyache, nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, fatigue, and convulsions. Soreness in the muscles, joints and tendons. Allergy. Allergic reaction in case of simultaneous exposure to sunlight.			
Validity:	5 years from the date of production (Cifin, PharmaCoDane Aps).			
Storage:	Normal temperature.			
Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Is given in combination with metronidazole (7.6 or 7.7) in connection with many infections. Should not be given to pregnant or breast-feeding patients.			

Stivkrampevaccine Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine. Vaccinen suppleres med tetanus immunglobulin (se 7.11). Vaccination skal ske i behandlingsrum med adgang til adgang til adrenalin(4.1) og genoplivningsudstyr(A.1).	7.10	Lægemiddelstof:	Tetanus holdig vaccine (tetanustoxoid)
		Form:	Injektionsvæske.
		Virkning:	Aktiverer patientens immunsystem.
		Dosering:	Følg ordination fra <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse og ømhed. Hovedpine, utilpashed og feber ses undertiden og fortager sig efter et døgn. Ledsmerter og hævede, ømme lymfeknuder kan ses på 8. dag. Allergisk shock forekommer sjældent.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Tetanusvaccine SSI).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen vaccine må ikke anvendes.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Tetanus vaccine To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine. The vaccine is to be supplemented by tetanus immune globulin (see 7.11). The vaccination must be given in a room with access to Epinephrine (4.1) and Resuscitation equipment (A.1).	7.10	Active pharmaceutical ingredients:	Vaccine containing Tetanus (tetanustoxoid)
		Form:	Injection liquid.
		Effect:	Activates the patient's immune system.
		Dosage:	Follow prescription from <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	Local blushing, swelling, and soreness. Headache, weak general condition, and fever are sometimes seen, which decrease after about 1 day. Arthralgia and swollen, sore lymph nodes may be seen on the eighth day.
		Validity:	2 years from the date of production (Tetanus vaccine SSI).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen vaccine must not be used.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections (continued)

Stivkrampemodgift Gives ved ulykker med kvæstelser og sår, med mindre den skadede med sikkerhed er dækket med stivkrampe-vaccine. Tetanus immunglobulin suppleres med vaccine (se 7.10). Behandlingen skal ske i behandlingsrum med adgang til 4.1 Adrenalin og A.1 Genoplivnings-udstyr.	7.11	Lægemiddelstof:	Humant tetanus immunglobulin
		Form:	Injektionsvæske 250 I.E. Ampul à 1 ml til intramuskulær injektion.
		Virkning:	Bekæmper giftstoffer produceret af stivkrampebakterien.
		Dosering:	1 injektion à 250 I.E. (1 ml) intramuskulært. Suppleres med tetanusvaccine (se 7.10).
		Bivirkninger:	Lokal rødme, hævelse, ømhed og feber ses undertiden. Allergisk shock og andre allergiske reaktioner forekommer, men sjældent.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Tetagam® P/Tetanogamma® P, Centeon).
		Opbevaring:	Opbevares køligt mellem 2 - 8° C. Frossen immunglobulin må ikke anvendes. Må ikke anvendes, hvis væsken fremstår uklar eller klumpet.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overfølsomhedsskock optræder sjældent. Behandling: Adrenalin 0,6 mg intramuskulært (4.1).
Tetanus antidote To be administered in case of accidents causing injury and wounds unless the wounded person is for certain covered by a tetanus vaccine. Tetanus immune globulin is to be supplemented by a vaccine (see 7.10). The treatment must be given in a room with access to 4.1 Adrenaline and A.1 Resuscitation equipment.	7.11	Active pharmaceutical ingredients:	Human tetanus immunoglobulin.
		Form:	Injection liquid 250 IU. Ampoule of 1 ml for intramuscular injection.
		Effect:	Combats poisonous substances produced by the tetanus bacteria.
		Dosage:	1 injection of 250 IU (1 ml) given intramuscularly. To be supplemented by the tetanus vaccine (see 7.10).
		Side-effects:	Local blushing, swollenness, soreness, and fever are sometimes seen.
		Validity:	3 years from the date of production (Tetagam® P/ Tetanogamma® P, CSL Behring).
		Storage:	To be stored cool at between 2-8°C. Frozen immune globulin must not be used. Not to be used if the liquid is muddy or lumpy.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
Infektioner forårsaget af stafylokokker. Knogleinfektion	7.12	Lægemiddelstof:	Flucloxacillin
		Form:	Tabletter à 500 mg.
		Virkning:	Bakteriedræbende.
		Dosering:	750-1000 mg 3-4 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré, hududslæt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato. Åbne blisterpakninger 6 måneder (Heracillin, Meda AS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Infections caused by staphylococci. Infections in the bones	7.12	Active pharmaceutical ingredients:	Flucloxacillin
		Form:	Tablets of 500 mg.
		Effect:	Kills bacteria.
		Dosage:	750-1000 mg 3-4 times daily.
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhea, skin rash.
		Validity:	2 years from the date of production. 6 months for open blister pack (Heracillin, Meda AS).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections				(continued)
Halsbetændelse Mundhuleinfektioner Bihulebetændelse Mellemørebetændelse Lungebetændelse Legionella Chlamydia infektioner Mavesårsinfektioner Alternativ til penicillin ved allergi MFAG tabel 9	7.15	Lægemiddelstof:	Azithromycin	
		Form:	Tabletter á 500mg	
		Virkning:	Standser bakteriernes vækst	
		Dosering:	Voksne: 500 mg x 1-2 dagligt	
		Bivirkninger:	Mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, kraftsløshed, svimmelhed, smagsforstyrrelser, hovedpine, hudkløe og hududslæt	
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Azithromycin, KRKA)	
		Opbevaring:	Almindelig temperatur	
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>	
Inflammation of the throat Infections of the oral cavity Sinusitis Inflammation of the middle ear Pneumonia Legionella Chlamydia infections Infections in connection with ulcer Alternative to penicillin in case of allergy MFAG table 9	7.15	Active Pharmaceutical ingredients:	Azithromycin	
		Form:	Tablets of 500mg	
		Effect:	Stops bacterial growth	
		Dosage:	Adults: 500 mg x 1-2 daily	
		Side-effects:	Abdominal pain, nausea, decreased appetite, weakness, dizziness, taste disturbances, headache, itchy skin and skin rash	
		Validity:	5 years from date of production (Azithromycin, KRKA)	
		Storage:	Normal temperature	
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>	
Urinvejsinfektioner	7.16	Lægemiddelstof:	Pivmecillinam	
		Form:	Tablet 400 mg	
		Virkning:	Bakteriedræbende	
		Dosering:	400 mg x 3-4 gange dagligt	
		Bivirkninger:	Kvalme,diarre, træthed, nældefeber, hudkløe, hududslæt, mundsår, hovedpine	
		Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Pivmecillinamhydrochlorid,"Paranova")	
		Opbevaring:	Almindelig temperatur	
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>	
Urinary tract infection	7.16	Active Pharmaceutical Ingredients:	Pivmecillinam	
		Form:	Tablets 400 mg	
		Effect:	Kills bacteria	
		Dosage:	400 mg x 3-4 times daily	
		Side-effects:	Nausea, diarrhoea, fatigue, hives, skin itching, skin rash, mouth ulcers, headache	
		Validity:	3 years from production date (Pivmecillinamhydrochlorid "Paranova")	
		Storage:	Normal temperature	
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>	

Grp. 7 Midler mod infektioner / Infections				(continued)
Herpes simplex Skoldkopper Herpes zoster (helvedesild)	7.17	Lægemiddelstof:	Aciclovir	
		Form:	Tablet 400 mg	
		Virkning:	Hæmmer virus produktionen	
		Dosering:	400-800 mg x 3 gange dagligt	
		Bivirkninger:	Diarré, kvalme, opkast, feber, kraftsløshed, træthed, hovedpine, døsighed, hudkløe, hududslæt, lysfølsom hud	
		Holdbarhed:	5 år fra produktions dato (Aciclovir, STADA Nordic ApS)	
		Opbevaring:	Opbevares under 25°C	
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>	
Herpes simplex Variceller Herpes zoster	7.17	Active Pharmaceutical Ingredients:	Acyclovir	
		Form:	Tablets 400 mg	
		Effect:	Inhibits virus production	
		Dosage:	400-800 mg x 3 times daily	
		Side-effects:	Diarrhoea, nausea, vomiting, fever, weakness, fatigue, headache, drowsiness, itchy skin, skin rash, photosensitive skin	
		Validity:	5 years from productions date (Aciclovir, STADA Nordic ApS)	
		Storage:	Do not store above 25°C	
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>	

Grp. 9 Hjerteog kredsløb / Cardiac and circuitry

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Førstehjælp: Hjertestilling (eleveret overkrop) 2 - 3 l ilt/minut Glycerylnitrat (9.1) Acetylsalicylsyre (9.3) Evt. for smerter: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)	9.1	Lægemiddelstof:	Glycerylnitrat
		Form:	Mundhule spray med 0,4 mg/dosis.
		Virkning:	Udvider blodkar. Virker inden 1 minut. Virkningsvarighed: 10 - 30 minutter.
		Dosering:	Medikamentet pustes ind under tungen eller på kindens inderside. 1 pust så hurtigt som muligt efter smerter opståen. Kan gentages 1 gang. Hvis smerterne ikke fortager sig, suppleres med morfin (3.4).
		Bivirkninger:	Ansigtssrødme, hovedpine og kvalme. Kan sænke blodtrykket lidt.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Glytrin®, Meda).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Beskyttes mod frost, direkte varme og sollys.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Overvåg blodtrykket, som helst ikke må komme under 90 mm Hg systolisk. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller gløder.
Angina pectoris Heart pain Coronary thrombosis First aid: Sit up in comfortable position 2-3 l oxygen/minute Glyceryl trinitrate (9.1) Acetylsalicylic acid (9.3) Possibly against pain: Morfin (3.4) / Tramadol (3.5)	9.1	Active pharmaceutical ingredients:	Glyceryl trinitrate.
		Form:	Oral cavity spray with 0.4 mg/dose.
		Effect:	Expands the blood vessels. Takes effect within 1 minute. Effective for 10-30 minutes.
		Dosage:	The medicament is sprayed under the tongue or at the inner side of the cheek. 1 spray as soon as possible after the pain has occurred. May be repeated once. If the pain does not decrease, supplement with morphine (3.4).
		Side-effects:	Blushing, headache, and nausea. May cause a minor fall in blood pressure.
		Validity:	2 years from the date of production (Glytrin®, Meda).
		Storage:	Not to be stored above 25°C. Protect from frost, direct heat and sunlight.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Control the blood pressure, which should not be below 90 mm Hg systolic. Not to be used close to open fire or embers.

Hjertekrampe Smerter i hjertet Blodprop i hjertet Blodfortynding Se også 9.1	9.3	Lægemiddelstof:	Acetylsalicylsyre
		Form:	Tabletter à 150 mg.
		Virkning:	Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.
		Dosering:	Akut: 300 mg som tygges. Vedligehold: 75 mg dagligt.
		Bivirkninger:	Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Cardiospasm Heart pain Coronary thrombosis Blood-thinning See also 9.1	9.3	Active pharmaceutical ingredients:	Acetylsalicylsyre.
		Form:	Tabletter à 150 mg.
		Effect:	Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper.
		Dosage:	Akut: 300 mg som tygges. Vedligehold: 75 mg dagligt.
		Side-effects:	Øget blødningsrisiko. Risiko for allergiske reaktioner. Farlig dosis: 150 mg per kg legemsvægt.
		Validity:	5 år fra produktionsdato (Hjertemagnyl®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Almindelig temperatur.
		Remarks:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke gives til patienter med mavesår.
Vand i lungerne Forhøjet blodtryk	9.4	Lægemiddelstof:	Furosemid.
		Form:	Tabletter à 40 mg.
		Virkning:	Tvinger væske ud af blodbanen via nyrerne til urinblæren, hvorefter væske suges fra lungerne (og andet væv). Virker 1/2 time efter indtagelse. Maksimumeffekt efter 2 timer. Virkningsvarighed: 3 - 6 timer.
		Dosering:	Vand i lungerne: 40 - 120 mg. Kan gentages efter 30 minutter. Blodtryksforhøjelse: 40 - 80 mg x 1 - 3 dagligt. (maksimalt 1500 mg/døgn).
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Furix®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

Lung edema High blood pressure	9.4	Active pharmaceutical ingredients:	Furosemide
		Form:	Tablets of 40 mg.
		Effect:	Extracts fluids from the blood vessel via the kidneys to the urinary bladder, after which the fluid is absorbed from the lungs (and other tissue). Takes effect after ½ hour. Maximum effect after 2 hours. Effective for 3-6 hours.
		Dosage:	Lungedema: 40-120 mg. May be repeated after 30 minutes. High blood pressure: 40-80 mg once to three times daily (maximum 1500 mg/day).
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	5 years from the date of production (Furix®, Nycomed Denmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
Blodfortyndende	9.8	Lægemiddelstof:	Apixaban
		Form:	Tablet á 5 mg
		Virkning:	Virker blodfortyndende. Forhindrer blodpropper
		Dosering:	5 - 10 mg x 2 dagligt, efter ordination af <i>Radio Medical</i>
		Bivirkninger:	Øget blødningstendens, kvalme hududslæt, blodig urin, vaginal blødning, blødning under huden
		Holdbarhed:	3 år fra produktion dato (Blister pk., Teva GmbH) 5 år fra produktions dato (Beholder, Teva GmbH)
		Opbevaring:	Normal temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Blood diluting	9.8	Active Pharmaceutical Ingredients:	Apixaban
		Form:	Tablets of 5 mg
		Effect:	Acts as a blood thinner. Prevents blood clots
		Dosage:	5-10 mg x 2 time daily, after prescription from <i>Radio Medical</i>
		Side-effects:	Increased tendency to bleed, nausea skin rash, bloody urine, vaginal bleeding, bleeding under the skin
		Validity:	3 years from production date (Blister pack, Teva GmbH) 5 years from production date (Container, Teva GmbH)
		Storage:	Normal Temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 9 Hjerte og kredsløb / Cardiac and circuitry

(continued)

Stopper blødninger	9.9	Lægemiddelstof:	Tranexamsyre
		Form:	injektion væske 100 mg/ml
		Virkning:	Forebyggelse og behandling af blødninger
		Dosering:	1 g i.v., 3 gange dagligt
		Bivirkninger:	Diarré, kvalme, opkast, hovedpine, allergisk hudreaktion
		Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Tranexamsyre, Pfizer ApS)
		Opbevaring:	Normal temperatur. Må ikke fryses
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Stops Bleedings	9.9	Active Pharmaceutical Ingredients:	Tranexamacid
		Form:	Injection liquid 100 mg/ml
		Effect:	Prevention and treatment of bleedings
		Dosage:	1g i.v., 3 times daily
		Side-effects:	Diarrhoea, nausea, vomiting, headache, allergic skin reaction
		Validity:	3 years from production date (Tranexamacid, Pfizer ApS)
		Storage:	Normale temperature. Do not freeze
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 10 Hudmidler / Dermatological agents

Lus Fladlus Fnat	10.6	Lægemiddelstof:	Permethrin
		Form:	Shampo 10 mg/g (1%).
		Virkning:	Gift, der dræber lus, fnatmider og deres æg.
		Dosering:	Indgnides i det renvaskede, froterede og fugtige hår og
		Bivirkninger:	Kløe og rødme af huden.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Se instruktionen i indlægsseddel.
Lice Crab lice Scabies	10.6	Active pharmaceutical ingredients:	Permethrin.
		Form:	Shampoo 10 mg/g (1%).
		Effect:	Poison that kills lice, scab mites, and their eggs.
		Dosage:	Apply to washed, rubbed, and wet hair and scalp.
		Side-effects:	Itching and skin blushing.
		Validity:	2 years from the date of production (Nix®, ACO Hud Nordic AB).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	See package leaflet.

Grp. 10 Hudmidler / Dermatological agents
(continued)

Eksem Psoriasis Hudkløe Solskoldning Hudsvi e efter insektb id	10.7	Lægemiddelstof:	Glukokortikoid gruppe II
		Form:	Creme til udvortes brug.
		Virkning:	Modvirker betændelsestilstande, der er fremkaldt af allergiske og toksiske årsager. Virker kløestillende og smertestillende.
		Dosering:	Voksne: Påsmøres tyndt 1-2 gange daglig.
		Bivirkninger:	Hudkløe brændende fornemmelse i huden, tynd hud, kontakteksem.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Locoid, Astellas Pharma A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Må ikke opbevares koldt eller fryses.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må ikke anvendes i åbne sår.
Eczema Psoriasis Itching Sunburns Burning sensation after insect bites	10.7	Active pharmaceutical ingredients:	Glucocorticoid group II
		Form:	Lotion for external use.
		Effect:	Eases inflammations caused by allergic or toxic agents. Antipruritic and analgesic.
		Dosage:	Adults: Apply a thin layer to the skin 1-2 times daily.
		Side-effects:	Pruritic, burning sensation in the skin, thin skin, contact dermatitis.
		Validity:	3 years from the date of production (Locoid, Astellas Pharma A/S).
		Storage:	Normal temperature. Do not refrigerate or freeze.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used in open wounds
Hudinfektioner	10.8	Lægemiddelstof:	Fusidin
		Form:	Salve 2%
		Virkning:	Bakteriedræbende
		Dosering:	Påsmøres det berørte hudområde 2-3 gange dagligt
		Bivirkninger:	Kontakteksem
		Holdbarhed:	2 år efter produktion dato (Fusidinsyre, Orifarm) 4 uger efter anbrud
		Opbevaring:	Normal temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> Må ikke anvendes i åbne sår
Skininfections	10.8	Active Pharmaceutical Ingredients:	Fusidin
		Form:	Ointment 2%
		Effect:	Kills bacteria
		Dosage:	Applies the affected skin area 2-3 times daily
		Side-effects:	Contact eczema
		Validity:	2 years from production date (Fusidins acid, Orifarm) 4 weeks after opening
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> Do not use in open wounds

Grp. 11 Desinficerende midler / Disinfectants

Rengøring af: 1. Instrumenter FØR og EFTER brug 2. Hænder 3. Intakt hud	11.1	Lægemiddelstof:	Klorhexidin/ethanol
		Form:	Væske 0,5-5% / 70-85%
		Virkning:	Desinficerende
		Dosering:	-
		Anmærkninger:	Må ikke anvendes i sår, i øjne eller på slimhinder. Indeholder 85 % alkohol. Se Søfartsstyrelsens Lægebog. Alternativt indkøbes chlorhexidin 0,5 % og ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker. Først anvendes chlorhexidin, derefter ethanol.
Disinfection of: 1. Instruments BEFORE and AFTER use 2. Hands 3. Intact skin	11.1	Active pharmaceutical ingredients:	Chlorhexidine/ethanol
		Form:	Liquid 0.5-5% / 70-85%
		Effect:	Disinfective
		Dosage:	-
		Remarks:	Not to be used in wounds, in eyes, or on mucous membranes. Contains 85% alcohol. See the Danish Maritime Authority's Medical Manual. Alternatively, Chlorhexidine 0.5% and ethanol with a minimum of 70% may be purchased in 2 separate bottles. Use chlorhexidine first and then ethanol.
Førstehjælpsbehandling af urene sår Mundskylning	11.2	Lægemiddelstof:	Klorhexidin
		Form:	Væske 0,2%.
		Virkning:	Desinficerende.
		Dosering:	Kan anvendes i forurenede sår, der er utilgængelig for normal sårrensning.
		Anmærkninger:	Se Lægebog for søfarende
First aid treatment of dirty wounds Mouth rinse	11.2	Active pharmaceutical ingredients:	Chlorhexidine
		Form:	Liquid 0.2%.
		Effect:	Disinfective.
		Dosage:	May be used for dirty wounds that are not accessible for normal wound disinfection.
		Remarks:	See Medical guide for seafarers

Grp. 12 Midler mod mave- og tarmsygdomme / Gastro intestinal agents

Diarré	12.6	Lægemiddelstof:	Loperamid.
		Form:	Tabletter à 2 mg.
		Virkning:	Hæmmer tarmenes bevægelser.
		Dosering:	Start: 2 tabletter. Pause 1 time. Derpå 1 tablet for hver uformet afføring. Maksimum: 8 tabletter (16 mg) per døgn.
		Bivirkninger:	Mundtørhed, kvalme, mavesmerter. Risiko for tarmstop.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Imodium®, McNeil).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Undersøg om den syge har feber. Bør kun anvendes til børn efter <i>Radio Medicals</i> anvisninger. Bør kun anvendes kortvarigt ved akut diarré hos i øvrigt upåvirkede personer.
Diarrhoea	12.6	Active pharmaceutical ingredients:	Loperamide
		Form:	Tablets of 2 mg.
		Effect:	Restricts the motility of the intestines.
		Dosage:	Start: 2 tablets. Wait for 1 hour. 1 tablet for every loose stool. Maximum: 8 tablets (16 mg) daily.
		Side-effects:	Dry mouth, nausea, slight stomach pains. Risk of intestinal
		Validity:	5 years from the date of production (Imodium®, McNeil).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Examine whether the patient has a fever. Should only be given to children on directions given by Radio Medical. Use only for a short period of time in case of acute diarrhoea on patients not otherwise affected.
Væsketab Salttab Febertilstande Opkastninger Diarré MFAG tabel 8, 10, 11.	12.7	Lægemiddelstof:	Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat/natriumcitrat/
		Form:	Afdelte pulvere.
		Virkning:	Erstatter væske og salte.
		Dosering:	1 pulver opløses i 1 liter kogt, afkølet vand. Basisbehov: 2,5 liter per døgn. For hver grad over 37° C gives yderligere 300 ml per døgn. For hver diarré gives
		Bivirkninger:	Ingen.
		Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato (Revolyt®, Gunnar Kjems APS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur. Færdigblandet opløsning opbevares i køleskab
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .

Loss of fluid Loss of salt Feverish conditions Vomiting Diarrhoea MFAG tables 8, 10, 11	12.7	Active pharmaceutical ingredients:	Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium.
		Form:	Divided powder.
		Effect:	Replaces liquids and salts.
		Dosage:	1 powder is dissolved in 1 litre of boiled, cooled water. Basic need: 2.5 litres daily. For every degree above 37° C, the patient is given another 300 ml daily. For every instance of
		Side-effects:	None.
		Validity:	2 years from the date of production (Revolyt®, Gunnar Kjems
		Storage:	Normal temperature. The mixed dissolution should be stored in a cold place.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
Mavesår	12.8	Lægemiddelstof:	Omeprazol
		Form:	Tablet eller kapsel 20 à mg.
		Virkning:	Hæmmer dannelsen af mavesyre.
		Dosering:	Mavesår: 20 – 40 mg dagligt. Langtidsbehandling: 10-20 mg dagligt.
		Bivirkninger:	Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse, luft i tarmen.
		Holdbarhed:	4 år fra produktionsdato. (Omeprazol, Copyfarm A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan eventuelt kombineres med antibiotika.
Stomach ulcer	12.8	Active pharmaceutical ingredients:	Omeprazol
		Form:	Tablet or capsules of 20 mg.
		Effect:	Inhibits gastric acid secretion.
		Dosage:	Stomach ulcer: 20-40 mg daily. Long term treatment: 10-20 mg daily.
		Side-effects:	Nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, flatulence,
		Validity:	4 years from the date of production (Omeprazol, Copyfarm A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Can be combined with antibiotics.

Sure opstød Halsbrand	12.9	Lægemiddelstof:	Antacida
		Form:	Tablet eller oral opløsning.
		Virkning:	Neutraliserer mavesyre.
		Dosering:	Jf. indlægsseddel i præparatet. Efter ordination af <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Forstoppelse, diarré.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Alminox®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Acid indigestion Heartburn	12.9	Active pharmaceutical ingredients:	Antacid
		Form:	Tablet or oral solution.
		Effect:	Neutralizes acid in the stomach.
		Dosage:	See patients information leaflet. Prescription from <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	Constipation, diarrhoea.
		Validity:	5 years from the date of production (Alminox®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .
Hæmorider Kløe ved endetarmen Smerter ved afføring	12.10	Lægemiddelstof:	Antihæmoride creme (skal indeholde glucokortikoid og smertestillende middel)
		Form:	Salve eller creme.
		Virkning:	Lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse og kløe i forbindelse med hæmoroider og analrifter.
		Dosering:	Voksne: Smøres på 2-3 gange daglig, samt efter afføring.
		Bivirkninger:	Anal slimhindeatrofi.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Proctosedyl, 2care4 ApS).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Haemorrhoids Itching at the rectum Pain during defecation	12.10	Active pharmaceutical ingredients:	Anti haemorrhoid ointment (Must contain glucocorticoid and analgesic).
		Form:	Ointment.
		Effect:	Relief of pain, swelling and burning sensation / itching associated with haemorrhoids, anal lacerations.
		Dosage:	Apply 2-3 times daily and after defecation.
		Side-effects:	Thin skin in the anus.
		Validity:	3 years from the date of production (Proctosedyl, 2care4 ApS).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Kvalme Opkastninge	12.13	Lægemiddelstof:	Ondansetron
		Form:	Tablet á 4 mg
		Virkning:	Modvirker kvalme og opkast
		Dosering:	Efter ordination fra <i>Radio Medical</i>
		Bivirkninger:	Hovedpine, forstoppelse, Rødme og varmfølelse
		Holdbarhed:	5 år fra produktions dato (Aurobindo Pharma)
		Opbevaring:	Normal temperatur
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Nausea Vomiting	12.13	Active Pharmaceutical Ingredients:	Ondansetron
		Form:	Tablets of 4 mg
		Effect:	Prevent nausea and vomiting
		Dosage:	By prescription from <i>Radio Medical</i>
		Side-effects:	Headache, Constipation, Redness and warm feeling
		Validity:	5 years from production date (Aurobindo Pharma)
		Storage:	Normal temperature
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>
Forstoppelse	12.14	Lægemiddelstof:	Movicol®
		Form:	Pulver til oral opløsning
		Virkning:	Binder væske i tarmen, hvorved afføringen blødgøres
		Dosering:	Efter ordination fra <i>Radio Medical</i>
		Bivirkninger:	Mavesmerter, Anal irritation, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
		Holdbarhed:	3 år fra produktions dato (Norgine BV)
		Opbevaring:	Ikke over 25°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Constipation	12.14	Active Pharmaceutical Ingredients:	Movicol®
		Form:	Powder for oral solution
		Effect:	Binds fluid in the intestine, thereby softening the stools
		Dosage:	By prescription from <i>Radio Medical</i>
		Side-effects:	Abdominal pain, Anal irritation, Diarrhea, Flatulence, Nausea, Meteorism, Vomiting
		Validity:	3 years from production date (Norgine BV)
		Storage:	Not above 25°C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 13 Øjen- og øremidler / Agents for Eyes and Ears

Grøn stær: Smerter i øjet, Regnbuesyn Tågesyn	13.4	Lægemiddelstof:	Pilocarpin
		Form:	Dråber à 20 mg/ml.
		Virkning:	Nedsætter trykket i det indre øje.
		Dosering:	Hyppig drypning bag nederste øjenlåg efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Sammentrækning i pupillens lukkemuskel ("knappenålpupil") og hovedpine.
		Holdbarhed:	1½ år fra produktionsdato (Pilocarpin "ophta" [®] , Ophtha A/S)
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Kan ikke anvendes sammen med kontaktlinser.
Glaucoma: Pains in the eye, Rainbow vision, Blurred vision	13.4	Active pharmaceutical ingredients:	Pilocarpine
		Form:	Eye drops of 20 mg/ml.
		Effect:	Reduces pressure inside the eye.
		Dosage:	Frequent drops behind the lower eyelid after prescription from <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	Spasms of the sphincter of the pupil ("pin-hole pupil") and headache.
		Validity:	1½ years from the date of production (Pilocarpin "ophtha" [®] , Ophtha A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used when wearing contact lenses.
Øregangseksem	13.12	Lægemiddelstof:	Ciprofloxacin / Hydrocortison
		Form:	Øredråber
		Virkning:	Behandling af øregangseksem
		Dosering:	3 dråber i berørte øre 2 gange daglig
		Bivirkninger:	Ørekløe, øresmerter, svimmelhed
		Holdbarhed:	Ubrudt 2 år fra produktionsdato (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Opbevaring:	Beskytte mod lys og ikke over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Ear eczema	13.12	Active Pharmaceutical ingredients:	Ciprofloxacin / Hydrocortisone
		Form:	Eardrops
		Effect:	Treatment of ear canal eczema
		Dosage:	3 drops in affected ear twice daily
		Side-effects:	Ear itching, earache, dizziness
		Validity:	Unbroken 2 years from production date (Ciflox, Novartis Healthcare A/S)
		Storage:	Protect from light and not more than 25°C. Do not refrigerate
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Øjen-betændelse	13.13	Lægemiddelstof:	Kloramfenikol
		Form:	Øjensalve 1%
		Virkning:	Bakteriedræbende
		Dosering:	Smørres 3- 6 gange dagligt i øjet
		Bivirkninger:	Øjenkløe, øjenirritation, allergisk reaktion
		Holdbarhed:	2 år fra produktion dato (Kloramfenikol, 2care4)
		Opbevaring:	Se indlægsseddel. Efter anbrud ikke over 25°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Eye infection	13.13	Active Pharmaceutical Ingredients:	Chloramphenicol
		Form:	Eye ointment 1%
		Effect:	Kills bacteria
		Dosage:	Apply 3-6 times daily in the eye
		Side-effects:	Eye itching, eye irritation, allergic reaction
		Validity:	2 years from production date (Kloramfenikol, 2care4)
		Storage:	See leaflet. After opening not above 25°C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>
Svejseøjne Lokalbedøvelse af øjet MFAG tabel 7	13.14	Lægemiddelstof:	Diclofenac
		Form:	Øjendråber 1 mg / ml
		Virkning:	Lokalbedøvende
		Dosering:	1 dråbe 3-5 gange dagligt
		Bivirkninger:	Irritation af øje, øjenkløe, sløret syn
		Holdbarhed:	2 år fra produktion dato (Dicloabak, 2care4)
		Opbevaring:	Ikke over 25°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Arc eye / Welders eye Local anaesthetic of the eye MFAG tabel 7	13.14	Active Pharmaceutical Ingredients:	Diclofenac
		Form:	Eye drops 1mg /ml
		Effect:	Local anaesthetic.
		Dosage:	1 drop, 3-5 time daily
		Side-effects:	Eye irritation, eye itching, blurred vision
		Validity:	2 years from production date (Dicloabak, 2 care4)
		Storage:	Not above 25°C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 14 Gynækologiske midler / Gynaecological agents

Blødning EFTER abort eller fødsel	14.2	Lægemiddelstof:	Methylergometrin
		Form:	Tabletter à 0,125 mg.
		Virkning:	Livmodersammentrækkende.
		Dosering:	Efter abort eller fødsel: 0,125-0,250 mg 3 gange dagligt.
		Bivirkninger:	Overfølsomhed, hovedpine, mavesmerter, forhøjet blodtryk, hududslet.
		Holdbarhed:	5 år fra produktionsdato (Methergin®, Novartis).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Må ikke anvendes til gravide med blødninger.
Bleeding AFTER giving birth or miscarriage	14.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Methylergometrine
		Form:	Tablets of 0.125 mg.
		Effect:	Contracts the uterus.
		Dosage:	After giving birth or miscarriage: 0.125-0.250 mg three times daily.
		Side-effects:	Allergy, headache, stomach ache, high blood pressure, rash.
		Validity:	5 years from the date of production (Methergine®, Novartis).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . Not to be used by pregnant women who are bleeding.

Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma

Hostestillende	15.1	Lægemiddelstof:	Dextromethorphan
		Form:	Tabletter á 30 mg.
		Virkning:	Hostestillende.
		Dosering:	15-30 mg. 3-4 gange daglig.
		Bivirkninger:	Ufrivillige muskelsammentrækning, døsighed, svimmelhed, hallucinationer, mani.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Dexofan® Nycomed).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Bør ikke anvendes af børn under 6 år. Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med 7.7 Metronidazol. Bør ikke anvendes ved samtidig behandling med Disulfiram (Antabus®).
Cough	15.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Dextromethorphan
		Form:	Tablets of 30 mg.
		Effect:	Reduces coughs.
		Dosage:	15-30 mg. 3-4 times daily.
		Side-effects:	Unvoluntary muscle contraction, drowsiness, dizziness, hallucinations and mania.
		Validity:	3 years from the date of production (Dexofan®, Nycomed).
		Storage:	Normal temperature.

		<i>Remarks:</i>	Consult <i>Radio Medical</i> . Should not be used by children under the age of 6 years Should not be used during concomitant treatment or 7.7 Metronidazole. Should not be used during concomitant treatment with disulfiram (Antabuse ®).
Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma (continued)			
Forkølelse Bihulebetændelse Kæbehulebetændelse Pandehulebetændelse Mellemørebetændelse	15.5	Lægemiddelstof:	Xylometazolin
		Form:	Næsedråber/næsespray. 1 mg/ml.
		Virkning:	Skaffer afløb fra mellemøret, bihuler, pandehuler og kæbehuler. Virker øjeblikkeligt og i 10 - 12 timer.
		Dosering:	2 pust/dråber i hvert næsebor 2 - 3 gange dagligt i maksimum 10 dage.
		Bivirkninger:	Ved længere tids anvendelse kan stoffet skade næsens
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		<i>Anmærkninger:</i>	Må ikke anvendes ved symptomer på grøn stær (se 13.4).
Cold Sinusitis Maxillary sinusitis Frontal sinusitis Otitis media	15.5	Active Pharmaceutical ingredients:	Xylometazoline
		Form:	Nose drops/nose spray. 1 mg/ml.
		Effect:	Opens drainage from middle ears and sinuses. Takes effect immediately and stays effective for 10-12 hours.
		Dosage:	2 sprays/drops in each nostril two-three times daily for a maximum of ten days.
		Side-effects:	If used for a long period, the substance may damage the
		Validity:	3 years from the date of production (Zymelin®, Nycomed Danmark).
		Storage:	Normal temperature.
		<i>Remarks:</i>	Not to be used if there are symptoms of glaucoma (see 13.4).

Grp. 15 Midler mod forkølelse og astma / Agents for common Cold and Asthma (continued)

Førstevalg ved astma eller astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe. MFAG tabel 9	15.7	Lægemiddelstof:	Salbutamol
		Form:	Inhalationsspray, 0.1 mg per dosis
		Virkning:	Løsnar kramper i den glatte muskulatur i luftvejene
		Dosering:	1 -2 pust. Max 4 gange dagligt
		Bivirkninger:	Muskelkramper, hurtig puls, rystelser, hovedpine
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Salbutamol, Teva B.V.)
		Opbevaring:	Ikke over 25°C - beskyt mod kulde og frost
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
First choice of medicament in case of asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes. MFAG tabel 9	15.7	Active Pharmaceutical Ingredients:	Salbutamol
		Form:	Spray, 0.1 mg per dose
		Effect:	Loosens convulsions in the smooth musculature in the respiratory tract
		Dosage:	1 -2 puff. Maximum 4 times daily
		Side-effects:	Muscle cramps, fast pulse, tremors, headache
		Validity:	3 years from the date of production (Salbutamol, Teva B.V.)
		Storage:	Below 25°C - protect against cold and frost
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>
Astma eller astmalignende vejrtrækning som følge af udsættelse for røg, gasarter og dampe. IMFAG tabel 9	15.8	Lægemiddelstof:	Glucocorticoid til inhalation
		Form:	Spray 100-200 mikrogram/dosis
		Virkning:	Fjerner inflammatorisk ødem og hævelse i luftvejene
		Dosering:	1 dosis efter behov
		Bivirkninger:	Svamp i munden, hovedpine, hæshed, hoste og halsgener
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (AeroBec, 2care4)
		Opbevaring:	Ikke over 25°C
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i>
Asthma or asthma-like breathing caused by exposure to smoke, gases, and fumes. MFAG tabel 9	15.8	Active Pharmaceutical Ingredients:	Glycocorticoid for inhalation
		Form:	Spray 100-200 microgram/dosage
		Effect:	Removes inflammatory oedema and swelling of the respiratory tract
		Dosage:	1 puff as required
		Side-effects:	Fungus in the mouth, headache, hoarseness, cough and sore throat
		Validity:	3 years from the date of production (AeroBec, 2care4)
		Storage:	Below 25°C
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i>

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			
1. valgs præparat ved: Blodtab Væsketab Forebyggelse af shock MFAG tabel 7	16.1	Lægemiddelstof:	Natriumklorid
		Form:	Infusionsvæske 9 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Erstatter væske og salte.
		Dosering:	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid isotonisk, Frenius Kabi).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4).
First choice of medicament in case of: Loss of blood Loss of liquid Prevention of shock MFAG table 7	16.1	Active Pharmaceutical ingredients:	Sodium chloride
		Form:	Infusion liquid 9 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		Effect:	Replaces liquids and salts.
		Dosage:	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	3 years from the date of production (Sodium chloride, Frenius Kabi).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4).
Ernæringserstatning Væsketab (Se også 12.7)	16.2	Lægemiddelstof:	Glucose og natriumklorid.
		Form:	Infusionsvæske med glucose 25 mg/ml og natriumklorid 4,5 mg/ml. Beholdere à 1000 ml til intravenøs anvendelse.
		Virkning:	Erstatter væske, glucose og salte.
		Dosering:	Normalt ikke over 500 ml per time (godt 150 dråber per minut). 20 dråber = 1 ml.
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Natriumklorid-Glucose "Braun", B. Braun Medical A/S).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> . Ved malaria og ved hjertetilfælde bør infusionshastigheden være langsom af hensyn til risikoen for udvikling af lungeødem (9.4/9.5).

Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar			(continued)
Food substitute Loss of liquids (See also 12.7)	16.2	Active Pharmaceutical ingredients:	Glucose and sodium chloride
		Form:	Infusion liquid containing glucose 25 mg/ml and sodium chloride 4.5 mg/ml. Containers of 1000 ml for intravenous use.
		Effect:	Replaces liquids, glucose and salts.
		Dosage:	Normally, no more than 500 ml per hour (about 150 drops a minute). 20 drops = 1 ml.
		Side-effects:	None relevant.
		Validity:	3 years from the date of production (Natriumklorid-Glucose" Braun", B. Braun Medical A/S).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> . In case of malaria and heart attacks, the infusion speed should be slow because of the risk of developing lung oedema (9.4).
Væske til gennemskylning af intravenøs kanyale. Sårbehandling. Øjenbehandling	16.5	Lægemiddelstof:	Natriumklorid
		Form:	Væske 0,9% i ca. 20 ml beholder.
		Virkning:	Fjerner blod fra venekanyale, renser sår og øjne.
		Dosering:	Se instruks i Søfartsstyrelsens lægebog eller efter ordination fra <i>Radio Medical</i> .
		Bivirkninger:	Ingen relevante.
		Holdbarhed:	3 år fra produktionsdato (Fresenius Kabi).
		Opbevaring:	Almindelig temperatur.
		Anmærkninger:	Søg samråd med <i>Radio Medical</i> .
Fluid for flushing intravenous needle. Treatment of wounds. Treatment of eyes	16.5	Active Pharmaceutical ingredients:	Sodium chloride
		Form:	Fluid 0,9 in containers of 20 ml.
		Effect:	Removes blood from intravenous needle, clean wounds and eyes.
		Dosage:	See the instructions in The Maritime Medical Manual or on prescription from <i>Radio Medical</i> .
		Side-effects:	No relevant ones.
		Validity:	3 years from the date of production (Fresenius Kabi).
		Storage:	Normal temperature.
		Remarks:	Consult <i>Radio Medical</i> .

Fortegnelse og kontrolldokument over lægemiddelstoffer

Inventory and Control Document of Active Pharmaceutical Ingredients

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
Grp. 1 Ilt / Oxygen						
1.1(π)	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	-	0	40 l /200 bar
1.1(π)	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas		0	40 l / 200 bar
1.3(π)	V03AN01	Medicinsk ilt passende til A.1 (se note)	Gas	-	2 x2 l/ 200 bar	0
1.3(π)	V03AN01	Oxygen Medical suitable to A.1 (see note)	Gas	-	2 x 2 l/ 200 bar	0
1.3 Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / Notice A Chapter IX B, annex 1						
Grp. 2 Lokalbedøvelse / Local Anaesthetic						
2.1(π)	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	10 mg/ ml	5 x 10 ml	0
2.1(π)	N01BB02	Lidocaine	Inj. Liquid	10 mg/ ml	5 x 10 ml	0
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	2 %	30 g	0
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	2 %	30 g	0
Grp. 3 Smertestillende midler / Analgesics						
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	500 mg	100 stk.	0
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	500 mg	100 pcs.	0
3.2(π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	400 mg	30 stk.	0
3.2(π)	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	400 mg	30 pcs.	0
3.4(π)	N02AA01	Morfin Δ	Inj. Væske	10 mg / ml	10 x 1 ml	0
3.4(π)	N02AA01	Morphine Δ	Inj. Liquid	10 mg / ml	10 x 1 ml	0
3.9(π)	N02AA01	Morphin hydrochloride Δ	Tablet	10 mg	30 stk	0
3.9(π)	N02AA01	Morphinehydrochloride Δ	Tablets	10 mg	30 pcs.	0
Grp. 4 Allergi, shock og søsyge / Allergy, Shock and Seasickness						
4.1(π)	C01CA24	Adrenalin	Inj. Væske	1 mg / ml	5 x 1ml	0
4.1(π)	C01CA24	Epinephrine	Inj. Liquid	1 mg / ml	5 x 1ml	0
4.2(π)	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	8 mg	12 pcs.	0
4.2(π)	R06AX18	Acrivastine	Capsula	8 mg	12 pcs.	0
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortison	Inj. pulver + væske	100 mg	1 hætteglas	0
4.3(π)	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	Inj. Subst + solvens	100 mg	1 vials	0
4.7(π)	R06AE03	Cyclizin Δ	Tablet	50 mg	30 stk.	0
4.7(π)	R06AE03	Cyclizine Δ	Tablets	50 mg	30 pcs.	0

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
Grp. 5 Antidoter / Antidotes						
5.1(π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	0,4 mg /ml	5 x 1 ml	0
5.1(π)	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	0,4 mg /ml	5 x 1 ml	0
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "K" (se note)	Inj. pulver + væske	1 mg	0	0
5.2(π)	H04AA01	Glucagon "R" (see note)	Inj. Subst + solvens	1 mg	0	0
5.3(π)	A03BA01	Atropin	Inj. Væske	1mg/ml	0	15 x 1ml
5.3(π)	A03BA01	Atropine	Inj. Liquid	1mg/ml	0	15 x 1ml
5.4(π)	D11AX03	Calcium gluconate	Gel	2%	0	5 x 25 g
5.4(π)	D11AX03	Calcium gluconate	Gel	2%	0	5 x 25 g
5.5(π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Brusetablet	500 mg	0	40 stk
5.5(π)	A12AA06	Calcium lactogluconate	Effervescent tablet	500 mg	0	40 pcs.
5,6	A07BA01	Aktivt kul	Pulver	50 g	0	2 x 50 g
5,6	A07BA01	Charcoal, activated	Powder	50 g	0	2 x 50 g
5.7	-	Ethyl alkohol	Væske	99.9%	0	1 x 500 ml
5.7	-	Ethyl alcohol	Liquid	99.9%	0	1 x 500 ml

5.2: 1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge/1 sets to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.

Grp. 6 Akut sindssyge og kramper / Mental disorder and convulsion

6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	5 mg	25 stk.	0
6.2(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	5 mg	25 pcs.	0
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	4 mg / ml	5 x 2½ ml	0
6.3(π)	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	4 mg / ml	5 x 2½ ml	0
6.4(π)	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	5 mg / ml	5 x 1 ml	0
6.4(π)	N05AD01	Haloperidole Δ	Inj. Liquid	5 mg / ml	5 x 1 ml	0
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	10 mg	10 stk.	0
6.5(π)	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	10 mg	10 pcs.	0

Grp. 7 Infektioner / Infections

7.1(π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	660 - 800 mg	100 stk.	0
7.1(π)	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	660 - 800 mg	100 pcs.	0
7.2(π)	J01CA04	Amoxicillin	Tablet	500 mg	30 stk.	0
7.2(π)	J01CA04	Amoxicillin	Tablets	500 mg	30 pcs.	0
7.7(π)	P01AB01	Metronidazol	Supp.	500 mg	20 stk.	0
7.7(π)	P01AB01	Metronidazole	Supp.	500 mg	20 pcs.	0
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	250 mg	20 stk.	0
7.8(π)	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	250 mg	20 pcs.	0
7.10(π)	-	Tetanus vaccine "K"	Inj. Væske	-	1 x 1 ml	0
7.10(π)	-	Tetanus vaccine "R"	Inj. Liquid	-	1 x 1 ml	0
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	250 IU.	1 x 1 ml	0
7.11(π)	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	250 IU.	1 x 1 ml	0
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	500 mg	50 stk.	0
7.12(π)	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	500 mg	50 pcs.	0
7.15(π)	J01FA10	Azithromycin	Tablet	500 mg	5 x 3 stk.	0
7.15(π)	J01FA10	Azithromycin	Tablets	500 mg	5 x 3 pcs.	0
7.16(π)	J01CA08	Pivmecillinam	Tablet	400 mg	50 stk.	0
7.16(π)	J01CA08	Pivmecillinam	Tablets	400 mg	50 pcs.	0
7.17(π)	J05AB01	Aciclovir	Tablet	400 mg	70 stk.	0
7.17(π)	J05AB01	Aciclovir	Tablets	400 mg	70 pcs.	0

7.15 Azithromycin erstatter den i MFAG angivet Erythromycin.- 7.15 Azitromycin replace the Erythromycin specified in the MFAG.

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
Grp. 9 Hjerte og kredsløb / Cardiac and circuitry						
9.1	C01DA02	Glycerylnitrate	Mund spray	0,4 mg/dose	1x200 doser	0
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	0,4 mg/dose	1x200 doses	0
9.3	B01AC06	Acetylsalicylsyre	Tablet	150 mg	100 stk.	0
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablet	150 mg	100 pcs.	0
9.4(π)	C03CA01	Furosemid	Tablet	40 mg	50 stk.	0
9.4(π)	C03CA01	Furosemide	Tablet	40 mg	50 pcs.	0
9.8(π)	B01AF02	Apixaban	Tablet	5 mg	28 stk.	0
9.8(π)	B01AF02	Apixaban	Tablets	5 mg	28 pcs.	0
9.9(π)	B02AA02	Tranexamsyre	Inj. væske	100 mg/ml	10 x 5 ml	0
9.9(π)	B02AA02	Tranexamsyre	Inj. liquid	100 mg/ml	10 x 5ml	0
Grp. 10 Hud / Skin						
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml	0
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	1%	50 ml	0
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Crema	Gruppe II	30 g	0
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion/Cream	Group II	30 g	0
10.8(π)	D06AX01	Fusidin	Cream / Salve	2%	4 x15 g	0
10.8(π)	D06AX01	Fusidine	Cream / Lotion	2%	4 x 15 g	0
Grp. 11 Desinficering / Desinfectants						
11.1	-	Klorhexidine/ethanol (se note)	Væske	0.5-5%/70-85%	175 ml	0
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol (see note)	Liquid	0.5-5%/70-85%	175 ml	0
11.2	-	Klorhexidine	Væske	0.2 %	4 x 250 ml	0
11.2	-	Chlorhexidine	Liquid	0.2 %	4 x 250 ml	0
11.1: Alternativt kan anvendes Klorhexidin 0,5 % og Ethanol minimum 70 %, i 2 separate flasker Alternatively, Chlorhexidine 0,5 % and ethanol with a minimum of 70 % in 2 separate bottles. Mix 1:1						
Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal						
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	2 mg	10 stk.	0
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	2 mg	10 pcs.	0
12.7	-	Glucose/kaliumklorid/magnesiumsulfat /natriumcitrat/natriumklorid.	Powder	30/1,1/0,11/2,1 g/pulver	0	6 x 20,5 g
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	30/1,1/0,11/2,1 g/powder	0	6 x 20,5 g
12.8(π)	A02BC01	Omeprazol	Tablet/Kapsel	20 mg	28 stk..	0
12.8(π)	A02BC01	Omeprazole	Tablets/Capsula	20 mg	28 pcs.	0
12.9	A02A	Antacida	Tablet eller oral opløsning	-	20 stk.eller 250 ml	0
12.9	A02A	Antacid	Tablet or oral solution	-	20 pcs. or 250 ml	0
12.10	C05A	Hæmorrhoid creme (skal indeholde glukokortikoid and smertestillende)	Crema/Salve	-	30 g	0
12.10	C05A	Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)	Lotion/Ointment	-	30 g	0

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
Grp. 12 Mave og tarm / Gastrointestinal						
12.13	A04AA01	Ondasetron	Tablet	4 mg	10 stk.	0
12.13	A04AA01	Ondasetron	tablets.	4 mg	10 pcs.	0
12.14	A06AD65	Movicol	oral opløsning	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	1 boks af 20 stk.	0
12.14	A06AD65	Movicol	oral solution	46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid, 178,5 mg natriumhydrogencarbonat.	1 box of 20 pcs.	0
12.13 Erstatte, den i MFAG nævnte, supple. Metoclopramid / Replaceses the supple. Metoclopramide described in MFAG.						

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Styrke / Strength	Mængde/ Quantity B	MFAG B
Grp. 13 Øjne og øre / Eyes and ears						
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	2%	10 ml	0
13.4(π)	S01EB51	Pilocarpine	Drops	2%	10 ml	0
13.12(π)	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	øretråber	10+2mg/ml	3 x 10 ml	0
13.12(π)	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	eardrops	10+2mg/ml	3 x 10 ml	0
13.13(π)	S01AA01	Kloramfenikol	øjensalve	1%	2 x 4,3 - 5 g	0
13.13(π)	S01AA01	Chloramphenicol	eye ointment	1%	2 x 4,3 - 5 g	0
13.14(π)	S01BC03	Diclofenac	øjendråber	1 mg/ml	2x10 ml	3 x 10 ml
13.14(π)	S01BC03	Diclofenac	eye drops	1 mg/ml	2x10 ml	3 x 10 ml
Grp. 14 Gynækologi /Gynaecology						
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	0,125 mg	10 pcs.	0
14.2(π)	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	0,125 mg	10 pcs.	0
14.2 skal kun forefindes, HVIS der er kvinder om bord./ shall only be available IF women on board.						
Grp. 15 Astma og forkølelse / Astma and common cold						
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	30 mg	20 stk.	0
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablets	30 mg	20 pcs.	0
15.7(π)	R03AC03	Salbutamol	Spray	0,1 mg/dosis	100 doser	100 doser
15.7(π)	R03AC03	Salbutamol	Spray	0,1 mg/dosage	100 dosis	100 dosis
15.8(π)	R03BA01	Glucocorticoid (inhalation)	Spray	100-200 mikrogram pr. dosis	0	5 x 100 doser
15.8(π)	R03BA01	Glucocorticoid (inhalation)	Spray	100-200 mikrogram per dosage	0	5 x 100 dosis
15.5(π)	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	1 mg / ml	10 ml	0
15.5(π)	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	1 mg / ml	10 ml	0
Grp. 16 Infusionsvæsker og lign. / Liquid for infusion and similar (see note / see note)						
16.1(π)	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	0.9 %	0	3 x 1 liter
16.1(π)	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	0.9 %	0	3 x 1 litre
16.2(π)	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	25/4,5 mg/ml	3 x 1 liter	0
16.2(π)	B05BB02	Glucose + sodium chloride	Inf. Liquid	25/4,5 mg/ml	3 x 1 litre	0
16.5(π)	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	0.9 %	20 x 20 ml	0
16.5(π)	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	0.9 %	20 x 20 ml	0
Infusionsvæskerne må ikke være i glasbeholder / Infusion liquids may not be in glass container						

Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine

[illegible]

Besætningens medbragte medicin / Crew member's private medicine

[illegible]

**Fortegnelse og kontrolldokument
over medicinsk udstyr**

**Inventory and Control Document
of Medical Equipment**

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B	MFAG B
A. Genoplivningsudstyr / Resuscitation equipment			
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr, klargjort (se note)	1 sæt	0
A.1	Mobile resuscitation equipment (see note)	1 set	0
A.4	Tungeholdere, Grøn, 80mm	0	2 stk.
A.4	Guidel airway, Green, 80mm	0	2 pcs.
A.5	Tungeholdere, Gul, 90mm	1 stk.	1 stk.
A.5	Guidel airway, Yellow, 90mm	1 pcs.	1 pc.
A.6	Tungeholdere, Rød, 100 mm	0	2 stk.
A.6	Guidel airway, Red, 100mm	0	2 pcs.
A.7	Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske	0	1 stk.
A.7	Extra ventilation bag with valve and mask	0	1 pc.
A.8	Kraftig klædesaks	1 stk.	0
A.8	Strong scissors for clothes	1 pcs.	0
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	2 stk.	0
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	2 pcs.	0
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	1 stk.	0
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	1 pcs.	0
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	2 stk.	8 stk.
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	2 pcs.	8 pcs.
A.18	Hjertestarter (AED)	1 stk.	0
A.18	Automatic extern difibrillator (AED)	1 pc.	0
A.19	Iltbrille	2 stk.	0
A.19	Nasal Cannula	2 pcs.	0
A.1: Meddelelser A kapitel A IX B, bilag 1 / A.1: Notice A Chapter IX B, annex 1			
B. Forbindinger og plastre / Dressings and adhesive tape			
B.2	Sterile gazekompresser, ca. 10 x 10 cm, ca. 8 lag	10 stk.	0
B.2	Sterile gaze compress, approx. 10 x 10 cm, approx. 8 layers	10 pcs.	0
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	3 ruller	0
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	3 rolls	0
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet	1 x 10 stk.	0
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet	1 x 10 pcs.	0
B.6	Sterile absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	1 stk.	0
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm	1 pcs.	0
B.7	Gazeviskers, usterile	100 stk.	0
B.7	Gauze swaps, non-sterile	100 pcs.	0
B.8	Tubegaze til fingerforbindinger	2 stk.	0
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	2 pcs.	0
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cm x 4m	5 ruller	0
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cm x 4m	5 rolls	0
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	1 pakke	0
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	1 pack	0
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	2 pakker	0
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x 1m	2 packs	0
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	1 rulle	0
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	1 roll	0
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	1 ruller	0
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	1 rolls	0
B.18	Årepresse til massiv blødning	1 stk.	0
B.18	Tourniquet for massive bleeding	1 pc.	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B	MFAG B
C. Udstyr til hygiejne / Equipment for sanitation			
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	20 stk.	0
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	20 pcs.	0
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	20 stk.	0
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	20 pcs.	0
C.5	Vaskesvampe, engangs	25 stk.	0
C.5	Bath sponge, disposable	25 pcs.	0
C.6	Beskyttelsesbriller	1 stk.	0
C.6	Protective goggles	1 pcs.	0
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	2 stk.	0
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	2 pcs.	0
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	250 ml	0
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	250 ml	0
C.13	Engangsforklæde	5 stk.	0
C.13	Disposable apron	5 stk.	0
C.14	Lagen, steril	1 stk.	0
C.14	Bed sheet, sterile	1 pc.	0
C.15	Absorberende underlag, ca.6 lag, 60x40 cm, usteril, engangs	10 stk.	0
C.15	Absorbent underlay, approx.6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable	10 pcs.	0
C.16	Opkastpose	10 stk.	0
C.16	Vormit bag	10 pcs.	0
D. Sårbehandling / Treatment of wounds			
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	10 stk	0
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	10 pcs.	0
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	6 stk.	0
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	6 pcs.	0
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	1 stk.	0
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18 x 9 x 3 cm	1 pcs.	0
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	1 stk.	0
D.7	Surgical scissors w/straight points	1 pcs.	0
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	1 stk.	0
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	1 pcs.	0
D.11	Splintpincet	1 stk.	0
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	1 pc.	0
D.12	Pean, krum	1 stk.	0
D.12	Pean, curved	1 pcs.	0
D.13	Nåleholder	1 stk.	0
D.13	Suture - holder	1 pcs.	0
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	1 stk.	0
D.14	Safety razor, disposable single use	1 pc.	0
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	4 stk.	0
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	4 pcs.	0
D.17	Ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25	6 stk	0
D.17	Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25	6 pcs.	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B	MFAG B
E. Udstyr til injektion og infusion / Equipment for injection and infusion			
E.1	Kanylebøtte	1 stk.	0
E.1	Box for contaminated needles	1 pcs.	0
E.2	Afsprøjtningssvaps m. isopropylalkohol 70%	50 stk.	0
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%	50 pcs.	0
E.3	Staserem	1 stk.	0
E.3	Torniquet for i.v.	1 pcs.	0
E.4	Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g (se note)	5 stk.	5 stk.
E.4	Intravenous cannula, 1.1 x 32, 20 g (see note)	5 pcs.	5 pcs.
E.5	Fikseringsplaster til intravenøs kanyle	5 stk.	5 stk.
E.5	Fixing plaster for intravenous cannula	5 pcs.	5 pcs.
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (se note)	10 stk.	40 stk.
E.6	Needle, sterile, disposable single use, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4) (see note)	10 pcs.	40 pcs.
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	5 stk.	45 stk.
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	5 pcs.	45 pcs.
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	5 stk.	5 stk.
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	5 pcs.	5 stk.
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	2 stk.	5 stk.
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	2 pcs.	5 pcs.
E.4+E.6: Kanyle i kaliber 0,8 og intravenøs kanyle kaliber 1,2, som beskrevet i MFAG, er erstattet af kanyle i kaliber 0,6 og intravenøs kanyle kaliber 1,1. E.4+E.6: Needles size 0.8 and intravenous cannula size 1.2, as described in MFAG, are replaced with needles size 0.6 and intravenous cannula size 1.1			
F. Udstyr til medicinskundersøgelse / Equipment for medical examination			
F.1	Blodtryksmåler	1 stk.	0
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pcs.	0
F.2	Stetoskop	1 stk.	0
F.2	Stethoscope	1 pcs.	0
F.3	Digitalt lægetermometer	1 stk.	0
F.3	Digital clinical thermometer	1 pcs.	0
F.4	Pencillygte m. batterier	1 stk.	0
F.4	Pencil lamp w/batteries	1 pcs.	0
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	5 stk.	0
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	5 pcs.	0
F.6	Pandelampe	1 stl.	0
F.6	Head lamp	1 pcs.	0
F.7	Hypotermi Termometer	1 stk.	0
F.7	Hypotermi thermometer	1 pc.	0
G. Udstyr til undersøgelse af blod og urin / Equipment for examination of blood and urine			
G.1	"Multistix® 5", urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter	50 stk.	0
G.1	"Multistix® 5", Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes	50 pcs.	0
G.7	Udstyr til måling af blodsukker (se note)	0	0
G.7	Equipment for measuring bloodsugar (see note)	0	0
G.7	1 sæt skal medbringes af besætningsmedlemmer med insulinkrævende sukkersyge		
G.7	1 set to be carried by crew members with insulin dependent diabetes.		

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quantity B	MFAG B
H. Øjenundersøgelse og behandling / Eye examination and treatment			
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	1 stk.	0
H.1	Lamp with UV light w/batteries	1 pc.	0
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	10 stk.	0
H.2	Fluorescent colour for the eye	10 pcs.	0
H.3	Vatpinde, sterile	20 stk.	0
H.3	Cotton sticks, sterile	20 pcs.	0
H.5	Øjenklap	1 stk.	0
H.5	Eye patch	1 pcs.	0
H.6	Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	4 stk.	0
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	4 pcs.	0
I. Udstyr til tømning af urinblæren / Equipment for drainage of urinary bladder			
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	2 stk.	0
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	2 pcs.	0
I.2	Urinkolbe, plastic	1 stk.	0
I.2	Bed bottle, plastic	1 pcs.	0
J. Udstyr til forstuvninger og brud / Equipment for sprains and fractures			
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	1 stk.	0
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	1 pcs.	0
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	1 stk.	0
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	1 pcs.	0
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	1 stk.	0
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	1 pcs.	0
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	2 stk.	0
J.4	Triangular scarf (Mitella)	2 pcs.	0
J.5	Sikkerhedsnåle	12 stk.	0
J.5	Safety pins	12 pcs.	0
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	2 stk.	0
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	2 pcs.	0
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	1 rulle	0
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	1 roll	0
K. Udstyr til immobilisering og transport / Equipment for immobilisation and transportation			
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	1 stk.	0
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	1 pcs.	0
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	1 stk.	0
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	1 pcs.	0
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	1 stk.	0
K.4	Stiff neck collar, adjustable	1 pcs.	0
M. Udstyr til sygepleje / Requisites for nursing			
M.1	Medicinnålebægre, ca. 25 ml, éngangs	10 stk.	0
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	10 pcs.	0

Grp. No.	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety B	MFAG B
O. Fortegnelser, lægebog m.v. / Inventories, Medical Guide, etc.			
O.2	Lægebog for Søfarende, udgivet af Seahealth	1 stk.	0
O.2	Medical guide for seafarers issued by Seahealth	1 pcs.	0
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B	1 stk	0
O.3	Inventory, Control document and Userinstruction Category B MFAG B	1 pcs.	0
O.5	Radio Medical Optegnelser	1 stk.	0
O.5	Radio Medical Records	1 pcs.	0
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	0	1 stk.
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	0	1 pc.
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. O.3 must be available in digital or printed version.			

Labels

1.1 Gas / Gas Medicinsk ilt / Medical Oxygen Indikation / Indication: Bevidstløse uden vejtrækning, Bevidstløse med vejtrækning, Medtaget almen tilstand. Slag mod kraniet, Større kvæstelser, Vejtrækningsbesvær / Unconscious, Weak general condition, Blows to the skull. Severe injuries, Difficulty breathing. Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Opbevares adskilt fra brandbare gasser og stoffer. Hold flasketemperaturen under 50°C / Keep away from flammable gases and substances. Keep bottle under 50°C
2.1 Inj. væske / inj. liquid Lidocain 10 mg/ml Indikation / Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
2.2 Gel / gel Lidocain 2% Indikation/Indication: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
3.1 Tablet / tablet Paracetamol 500 mg Indikation / Indication: Svage smerter / Weak pain; MFAG tables 7, 8, 13 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
3.2 Tablet / tablet Ibuprofen 400 mg Indikation / Indication: Moderate smerter / Moderate pain Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
3.4 Inj. væske / inj. liquid Δ Morfin 10 mg/ ml Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; MFAG tables 7, 8, 10, 13 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
3.9 Tablet / tablet Morphine hydrochloride 10 mg Indikation / Indication: Stærke smerter / Severe pain; Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
4.1 Inj. væske / inj. liquid Adrenalin 1 mg/ml Indikation / Indication: Allergisk Shock / Allergic shock Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring: Læs indlgsseddel/ Storage: Read packet insert
4.2 Kapsel / capsule Acrivastin 8 mg Indikation / Indication: Allergi / Allergy Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
4.3 Inj. væske / inj. liquid Hydrocortisonsuccinat 100 mg/2 ml Indikation / Indication: Allergi / Allergy Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature

4.7 Tablet / tablet Δ Cyclizine 50 mg Indikation / Indication: Søsyge / Seasickness Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
5.1 Inj. væske / inj. liquid Naloxone 0,4 mg/ml Indikation/Indication: Morfin antidot / Morphine antidote MFAG tables 4, 13 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
5.3 Inj. væske / inj. liquid Atropin 1 mg/ml Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG table 17 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
5.4 Gel / gel Calcium gluconate 2 % Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG table 8, 16 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
5.5 Tablet / tablet Calciumlactogluconate 500 mg Indikation / Indication: Antidot / Antidote / MFAG tables 16 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
5.6 Afdelt pulver / powder Aktivt kul / Activated charcoal Indikation / Indication: Antidot / Antidote/ MFAG table 10 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
5.7 Væske / liquid Ethyl alcohol 99,5% Indikation/Indication: Antidot / Antidote/ MFAG table 19 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
6.2 Tablet / tablet Δ Diazepam 5 mg Indikation / Indication: Angst / Anxiety Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
6.3 Klysma / enema Δ Diazepam 4 mg/ml Indikation / Indication: Kramper / Convulsions; MFAG tables 4, 5, 6 Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
6.4 Inj. væske / inj liquid Δ Haloperidol 5 mg/ml Indikation / Indication: Sindssyge / Mental disease Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
6.5 Tablet / tablet Δ Zolpidem 10 mg Indikation / Indication: Søvnløshed / insomnia Ref: Se Fortegnensens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature

7.1 Tablet / tablet Phenoxymethylpenicillin 660 - 800 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
7.2 Tablet / tablet Amoxicillin 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 9 Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.7 Suppositorie / suppository Metronidazol 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections / MFAG table 10 Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
7.8 Tablet / tablet Ciprofloxacin 250 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
7.10 Vaccine / vaccine Tetanus holdig vacc. /vacc. containing Tetanus Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C
7.11 Immunglobulin / immunglobuline Tetanus 250 IE/ml Indikation / Indication: Forebyggelse mod stivkrampe / Tetanus prevention Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2- 8°C
7.12 Tablet / tablet Flucloxacillin 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
7.15 Tablet / Tablets Azithromycin 500 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.16 Tablet / Tablets Pivmecillinam 400 mg Indikation / Indication: Infektioner / Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
7.17 Tablet / Tablets Aciclovir 400 mg Indikation / Indication: virus-Infektioner /viral-Infections Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.1 Spray / aerosol Glycerolnitrat 0,4 mg/dose Indikation / Indication: Hjertekrampe / Angina pectoris Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: 2 - 25°C

9.3 Tablet / tablet Acetylsalicylsyre / acetylsalicylic acid 150 mg Indikation / Indication: Blodfortyndende / Blood thinning Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
9.4 Tablet / tablet Furosemid 40 mg Indikation / Indication: Vanddrivende / Diuretic Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
9.8 tablet / Tablets Apixaban 5 mg Indikation / Indication: Blodfortyndende/ Blood diluting Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
9.9 inj. / inj. Tranexamsyre / Tranexamic acid 100 mg/ml Indikation / Indication: Stopper blødninger/ Stops Bleedings Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
10.6 Shampoo / shampoo Permethrin 1% Indikation / Indication: Lus / Lice Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
10.7 creme / lotion Glukokortikoid gruppe II /glucocorticoid group II Indikation / Indication: Eksem / Eczema Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
10.8 Salve / ointment Fusidin 2 % Indikation / Indication: Hud infektion / Skin infection Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
11.1 Væske / liquid Chlorhexidin / Ethanol 0,5-5%/70-85% Indikation / Indication: Desinfektion af instrumenter / Disinfection of instruments Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
11.2 Væske / liquid Chlorhexidin 0,2% Indikation / Indication: Behandling af urene sår, mundskyl / Treatment of dirty wounds, mouth rinse. Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
12.6 Tablet / tablet Loperamid 2 mg Indikation / Indication: Diarré / Diarrhea Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
12.7 Pulver / powder Glucose / kalium / magnesium / natrium citrat/natrium/ Glucose/potassium/magnesium/sodium citrate/sodium 30/1, 1/0, 11/2, 1 g/enhed Indikation / Indication: Væske- og salttab / Rehydration MFAG table 8, Ref: Se Fortegnelseens brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature

12.8 Kapsler / capsule Omeprazol 20 mg Indikation / Indication: Mavesår / Stomach ulcer Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
12.9 Tablet eller oral opløsning / tablet or oral solution Antacida Indikation / Indication: Sure opstød og halsbrand / acid indigestion and heartburn Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
12.10 Rektalsalve / rectal ointment Hæmorrhoid creme / Anti hæmorrhoid agent Indikation / Indication: Analkløe / Anal pruritis Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: < 25 °C
12.13 Tablet / Tablets Ondasetron 4 mg Indikation / Indication: Kvalme og opkastning / Nausea and vomiting M FAG table 7, 8, 10, 13, 15, 20 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / Storage normal temperatur.
12.14 Pulver / Powder Movicol® Indikation / Indication: Forstoppelse / Constipation Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
13.4 Øjendråber / eyedrops Pilocarpin 20 mg/ml Indikation / Indication: Grøn stær / Glaucoma Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
13.12 Øredråber / Eardrops Ciprofloxacin / Hydrocortison 10+2 mg Indikation: Øregangs eksem / Ear canal eczema Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical
13.13 Øjensalve / eye ointment Chloramphenicol 1% Indikation: øjen infektion / Eye infection Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur
13.14 Øjendråber / Eye drops Diclofenac 1 mg/ml Indikation: Lokalbedøvelse / Local anaesthetic. Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read user instruction in the inventory. Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Ikke over 25°C / Not above 25°C

14.2 Tablet / tablet Methylethylergometrin 0,125 mg Indikation / Indication: Blødning efter fødsel / Bleeding after giving birth Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
15.1 Tablet / Tablet Dextromethorphan 30 mg Indikation / Indication: Hoste / Cough Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
15.5 Næsespray / dråber / nose spray / drops Xylometazolin 1 mg/ml Indikation / Indication: Forkølelse / Common cold Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
15.7 Inhalations Spray / Inhalation Spray Salbutamol 0,1 mg Indikation / Indication: Astma / Astma Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
15.8 Inhalations spray / Inhalation spray Glucocorticoid 100-200 µg Indikation / Indication: Astma / Astma Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: normal temperatur / normal temperature
16.1 Inf.væske / inf.liquid Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml Indikation / Indication: Blodtab / Loss of blood; M FAG table 7 Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
16.2 Inf.væske / inf.liquid Glucose og natrium / glucose and sodium 25/4,5 mg/ml Indikation / Indication: Væsketab / Rehydration Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature
16.5 Inj. væske / inj.liquid Natriumklorid / sodium chloride 9 mg/ml Indikation / Indication: Væske til gennemskylning af intravenøs kanyule, sårbehandling, øjenbehandling / Fluid for flushing intravenous needle, treatment of wound, treatment of eyes Ref: Se Fortegnelse brugervejledning / Read the user instruction in the Inventory Søg samråd med Radio Medical / Consult Radio Medical Opbevaring / storage: Almindelig temperatur / normal temperature

INDEX

Abdominal infections	31	Breathing difficulties	12
Abstinenskramper	27	Brud	27
Acetylsalicylsyre	38	Brugervejledning Lægemiddelstoffer	11
Aciclovir	36; 56; 70; 79; 86	Burning sensation, skin	41
Acid indigestion	45	Burns	16
Acrivastin	18	Calciumgluconat	23
Acrivastine	18	Calciumgluconate	24
Active carbon	25	Calciumlactogluconat, calciumcarbonat.	24
Acute diarrhoea	32	Calciumlactogluconate, calciumcarbonate.	24
Acute mental disease	27	Cardiospasm	38
Acute mental illness	28	Caustic burns, fluorine	24
Adrenalin	17	Caustic burns, stomach, intestines	25
Aktivt kul	25	Chlamydia infections	35
Akut diarré	32	Chlamydia infektioner	35
Akut sindssyge	27; 28	Chloramphenicol	48
Alcoholic withdrawal symptoms	27	Chlorhexidin.	42
Alkoholabstinenser	27	Cholera	32
Allergi	18; 19	Ciprofloxacin	32
Allergic asthma	18; 19	Ciprofloxacin	32
Allergic face oedema	18; 19	Cold	50
Allergic shock	17	Constipation	46
Allergisk ansigtsødem	18; 19	Convulsions	27
Allergisk astma	18; 19	Convulsions , universal	28
Allergisk shock	17	Convulsions, poisoning	28
Allergy	18; 19	Convulsions, Withdrawal	28
Amoxicillin.	30	Coronary thrombosis	16; 37; 38
Amoxicilline	31	Cough	49
Angina pectoris	37	Crab lice	40
Angst	27; 28	Cyclizin	20
Antacid	45	Cyclizine	20
Antacida	45	Delusions	28
Antidote, morphine	21	Dextromethorphan.	49
Antihæmorrhoid creme	45	Diarré	43
Anxiety	27; 28	Diarrhoea	43; 44
Apixaban	39; 86	Diazepam	27; 28
Appendicitis	31; 32	Diclofenac	48
Arc eye	48	Difficulty falling asleep	29
asthma	51	Dirty wounds, Disinfection	42
Asthma	51	Dislocations	27
asthma-like breathing	51	Dysenteri	32
astma	51	Dysentery	32
Astma	51	Eksem	41
astmalignende vejrtrækning	51	Epilepsi	27
Atropin	23	Epilepsy	28
Azithromycin	35; 86	Epinephrine	17
Back pains	14	Ernæringserstatning	52
Bevidstløs med vejrtrækning	12	Ethyl alcohol	26
Bevidstløs uden vejrtrækning	12	Ethyl alkohol	26
Bihulebetændelse	30; 50	Eye infection	48
Bihulebetændelse	35	Eyes, Treatment	53
Bleeding, after birth	49	Feber	14
Bleeding, miscarriage	49	Febertilstande	43
Blindtarmsbetændelse	31; 32	Female reproductions organs, infection	31
Blodfortyndende	39	Fever	14
Blodfortynding	38	Feverish conditions	44
Blodprop i hjertet	15; 37; 38	Fladlus	40
Blodtab	52	Flucloxacillin	34
Blood diluting	39	Flushing, intravenous needle	53
Blood-thinning	38	Fnat	40
Blurred vision	47	Food substitute	53
Blødning, abort	49	Forbrændinger	15
Blødning, fødsel	49	Forgiftning, insektgift	23
Boil in the throat	32	Forgiftninger med methanol, ethylene glycol	26
Bone-ache	15	Forgiftninger, mave, tarm	25
Bones, infections	34	Forhøjet blodtryk	38

Forkølelse	50	Insect bites	41
Forstoppelse	46	Insecticides	23
Fractures	15; 16; 27	Insektbid	41
Frontal sinusitis	50	Insektgifte	23
Furosemid	38	Insomnia	29
Furosemide	39	Instrumenter, desinficering	42
Fusidin	41; 86	Instruments, Disinfection	42
Galdesten	15	Insulin shock	22
Gall stone	16	Insulinshock	22
Gennemskylning, intravenøskanyle	53	Insulintilfælde	22
Glaucoma	47	Intact skin, Disinfection	42
Glucagon	22	Intakt hud, desinficering	42
Glucocorticoid til inhalation	51	Intestinal infections	31
Glucocorticoid group II	41	Itching, rectum	45
Glucose and sodium chloride.	53	Kidney stone	16
Glucose og natriumklorid.	52	Kloramfenikol	48
Glukokortikoid gruppe II	41	Klorhexidin.	42
Glyceryl trinitrate	37	Klorhexidin/ethanol.	42
Glycerylnitrat	37	Kløe, endetarmen	45
Glycocorticoid for inhalation	51	Kløestillende	13
Gonore	32	Knoglebrud	14
Gonorrhoea	32	Knogleinfektion	31; 34
Grøn stær:	47	Knoglesmerter	14
Haemorrhoids	45	Kolera	32
Hallucinationer.	28	Kramper	27
Hallucinations.	28	Kramper, forgiftninger	27
Haloperidol	28	Kramper, universelle	27
Haloperidole.	28	Kvalme	46
Halsbetændelse	30; 35	Kvalme og opkastninger	28
Halsbrand	45	Kvæstelser	15
Halsbyld	31; 32	Kæbehulebetændelse	50
Hands, Disinfection	42	Lavt blodsukker	22
Hay fever	18	Ledskred	27
Headache	14	Ledsmerter	14
Heart pain	37; 38	Legionella	35
Heartburn	45	Lice	40
helvedesild	36	Lidocain	12; 13
Herpes simplex	36	Lidocaine	13
Herpes zoster	36		85
High blood pressure	39		85
Hjertekrampe	37; 38	Local anaesthetics	13
Hostestillende	49	Lokalbedøvelse	12; 13
Hovedpine	14	Lokalbedøvelse, øjet	48
Hudinfektioner	41	Loperamid	43
Hudkløe	41	Loperamide.	43
Hudsvie	41	Loss of blood	52
Human tetanus immunoglobulin	34	Loss of fluid	44
Humant tetanus immunoglobulin	34	Loss of liquid	52
Hydrocortison.	19	Loss of liquids	53
Hydrocortisonsuccinate	19	Low blood sugar	22
Hypoglycaemic coma	22	Lung edema	39
Hæmorider	45	Lungebetændelse	30; 35
Hænder, desinficering	42	Lungebetændelse, giftige kemiske stoffer	30
Høfeber	18	Lungepest	32
Ibuprofen.	14; 15	Lus	40
Indsovningsbesvær	29	Major wounds	16
Infections in connection with ulcer	35	Mani, vildskab	28
Infections of the oral cavity	35	Mania, wildness	28
Infections, oral cavity	30	Mavesår	44
Infektioner, stafylokokker	34	Mavesårsinfektioner	35
Inflammation of the middle ear	35	Maxillary sinusitis	50
Inflammation of the throat	35	Medical oxygen	12
Inflammation, middle ear	30	Medicinsk ilt.	12
Inflammation, throat	30	Medtaget almen tilstand	12
Injuries	16	Mellemørebetændelse	30; 35; 50

Menstruationssmerter	14	Pivmecillinam	35; 86
Mental restlessness	28	Pneumonia	30; 35
Methylethylmercurin.	49	Pneumonia, poisonous chemical substances	31
Methylethylmercurine.	49	Pneumonic plague	32
Metronidazol.	31	Poisoning, insecticides	23
MFAG tabel 4, 5, 6	28	Poisoning, methanole, ethylene glycole	26
MFAG tabel 8, 10, 11	43	Poisoning, stomach, intestines	25
MFAG tabel 8, 10, 11:	44	Psoriasis	41
MFAG tabel 10	25; 31	Psyisk uro	28
MFAG tabel 16	24	Pyelitis	32
MFAG tabel 17	23	Rainbow vision	47
MFAG tabel 19	26	Regnbuesyn	47
MFAG tabel 2, 3, 5, 9, 11	12	Relieves itching	13
MFAG tabel 4, 13	21	Restlessness	27
MFAG tabel 4, 5, 6	27	Rygsmerte	14
MFAG tabel 7	52	Salbutamol	51
MFAG tabel 7, 8, 10, 13	15	Salbutamol.	51
MFAG tabel 7, 8, 10, 13	16	Salttab	43
MFAG tabel 8, 16	23; 24	Scabies	40
MFAG tabel 9	30; 35	Seasickness	20
MFAG tabel 10	25	Severe bronchitis	32
MFAG tabel 17	23	Severe injuries	12
MFAG tabel 9	31; 35	Severe pain	16
Moderate pains:	15	Shock, forebyggelse	52
Moderate smerte:	14	Shock, prevention	52
Modgift, morfin	21	Sinusitis	30; 35; 50
Morfin	15	Skininfections	41
Morfin 	16	Skoldkopper	36
Morphine	16	Smerter i hjertet	37; 38
Morphine 	16	Smerter, afføring	45
Motoric restlessness,	28	Smerter, øje	47
Motorisk uro	28	Sodium chloride	52; 53
Mouth rinse	42	Solskoldning	41
Movicol®	46; 71; 80	Staphylococci	34
Mundhuleinfektioner	30; 35	Stivkrampemodgift	34
Mundskylning	42	Stivkrampvaccine	33
Muscle pains	15	Stomach ulcer	44
Muskelsmerter	14	Stopper blødninger	40
Naloxon	21	Stops Bleedings	40
Naloxone	21	Stops breathing	21
Natriumklorid	53	Store sårskader	15
Natriumklorid.	52	Stærke smerte	16
Nausea	46	Stærke smerte:	15
Nausea and vomiting	28	Større kvæstelser	12
Nyrebetændelse	32	Sunburns	41
Nyresten	15	Sure opstød	45
Nældefeber	18	Suture of wounds	13
Omeprazol	44	Svage smerte	14
Ondansetron	46; 80	Svejseøjne	48
Opkastning	46	Svær bronkitis	32
Opkastninger	43	Syning af sår	12
Otitis media	50	Søsyge	20
Oxygen	12	Søvnløshed	29
Pain during defecation	45	Sårbehandling.	53
Pain in joints	15	Tandbyld	31; 32
Pains, eye	47	Tarminfektioner	31
Pandehulebetændelse	50	Tetanus antidote	34
Paracetamol	14	Tetanus holdig vaccine	33
Paracetamol.	14	Tetanus vaccine	33
Period pains	15	tetanustoxoid	33
Permethrin.	40	Tooth abscess	32
Phenoxymethylpencillin	30	Tranexacid	40
Phenoxymethylpenicillin	30	Tranexamsyre	40
Pilocarpin	47	Tågesyn	47
Pilocarpine	47	Udsættende vejtrækning	21

Unconscious with breathing	12
Unconscious without breathing	12
Underlivsinfektioner	31
Urene sår, desinficering	42
Urethritis	32
Urinary tract infection	35
Urinrørsbetændelse	32
Urinvejsinfektioner	35
urotilstande	27
Urticaria	18
User instruction Active Pharmaceutical Ingredients	11
Vand i lungerne	38
Variceller	36
Vejtrækningsbesvær	12
Vomiting	44; 46
Vrangforestillinger	28
Væsketab	43; 52
Weak general condition	12
Weak pains:	14
Welders eye	48
Wounds, Treatment	53
Xylometazolin.	50
Xylometazoline.	50
Zolpidem	29
Ændringer/ Changes	87
Ætsninger, fluorholdige	23; 24
Ætsninger, mave, tarm	25
Øjenbehandling	53
Øjenbetændelse	48

Rekvisition lægemidler og udstyr

**Requisition Active Pharmaceutical Ingredient
and equipment**

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
1.1	V03AN01	Medicinsk ilt	Gas	
1.1	V03AN01	Oxygen, Medical	Gas	
1.3	-	Ekstra iltflaske	Gas	
1.3	-	Spare oxygen cylinder	Gas	
2.1	N01BB02	Lidocain	Inj. Væske	
2.1	N01BB02	Lidocaine	Inj. Væske	
2.2	D04AB01	Lidocain	Gel	
2.2	D04AB01	Lidocaine	Gel	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablet	
3.1	N02BE01	Paracetamol	Tablets	
3.2	M01AE01	Ibuprofen	Tablet	
3.2	M01AE01	Ibuprofen	Tablets	
3.4	N02AA01	Morfin ^Δ	Inj. Væske	
3.4	N02AA01	Morphine ^Δ	Inj. Liquid	
3.9	N02AA01	Morphinhydroclorid ^Δ	Tablet	
3.9	N02AA01	Morphinehydrochloride ^Δ	Tablets	
4.1	C01CA24	Adrenalin	inj. Væske	
4.1	C01CA24	Epinephrine	inj. Liquid	
4.2	R06AX18	Acrivastin	Kapsel	
4.2	R06AX18	Acrivastine	Capsula	
4.3	H02AB09	Hydrocortison	inj. tørstof + væske	
4.3	H02AB09	Hydrocortisonsuccinate	inj. Subst + solvens	
4.7	R06AE03	Cyclizin ^Δ	Tablet	
4.7	R06AE03	Cyclizine ^Δ	Tablets	
5.1	V03AB15	Naloxon	Inj. Væske	
5.1	V03AB15	Naloxon	Inj. Liquid	
5.2	H04AA01	Glucagon "K"	inj. tørstof + væske	
5.2	H04AA01	Glucagon "R"	inj. Subst + solvens	
5.3	A03BA01	Atropin	Inj. Væske	
5.3	A03BA01	Atropine	Inj. Liquid	
5.4	D11AX03	Calcium gluconate	gel	
5.4	D11AX03	Calcium gluconate	gel	
5.5	A12AA06	Calcium lactogluconate	Brusetablet	
5.5	A12AA06	Calcium lactogluconate	Effervescent tablet	
5.6	A07BA01	Aktivt kul	pulver	
5.6	A07BA01	Charcoal, activated	powder	
5.7	-	Ethyl alcohol	Væske	
5.7	-	Ethyl alcohol	Liquid	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
6.2	N05BA01	Diazepam Δ	Tablet	
6.2	N05BA01	Diazepam Δ	Tablets	
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Klysma	
6.3	N05BA01	Diazepam Δ	Enema	
6.4	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Væske	
6.4	N05AD01	Haloperidol Δ	Inj. Liquid	
6.5	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablet	
6.5	N05CF02	Zolpidem Δ	Tablets	
7.1	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablet	
7.1	J01CE02	Phenoxymethylpenicillin	Tablets	
7.2	J01CA04	Amoxicillin	Tablet	
7.2	J01CA04	Amoxicillin	Tablets	
7.7	P01AB01	Metronidazol	Supp.	
7.7	P01AB01	Metronidazole	Supp.	
7.8	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablet	
7.8	J01MA02	Ciprofloxacin	Tablets	
7.10	-	Tetanus vaccine "K"	Inj. Væske	
7.10	-	Tetanus vaccine "R"	Inj. Liquid	
7.11	J06BB02	Tetanus immunglobulin "K"	Inj. Væske	
7.11	J06BB02	Tetanus immunglobulin "R"	Inj. Liquid	
7.12	J01CF05	Flucloxacillin	Tablet	
7.12	J01CF05	Flucloxacillin	Tablets	
7.15	J01FA10	Azithromycin	Tablet	
7.15	J01FA10	Azithromycin	Tablets	
7.16	J01CA08	Pivmecillinam	Tablet	
7.16	J01CA08	Pivmecillinam	Tablets	
7.17	J05AB01	Aciclovir	Tablet	
7.17	J05AB01	Aciclovir	Tablets	
9.1	C01DA02	Glycerylnitrat	Mund pray	
9.1	C01DA02	Glyceryl trinitrate	Oral spray	
9.3	B01AC06	Acetylsalisylsyre	Tablet	
9.3	B01AC06	Acetylsalicylic Acid	Tablets	
9.4	C03CA01	Furosemid	Tablet	
9.4	C03CA01	Furosemide	Tablets	
9.8	B01AF02	Apixaban	Tablet	
9.8	B01AF02	Apixaban	Tablets	
9.9	B02AA02	Tranexamsyre	Inj. væske	
9.9	B02AA02	Tranexamsyre	Inj. liquid	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.6	P03AC04	Permethrin	Shampoo	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid gruppe II	Crema	
10.7	D07AB02	Glukocorticoid group II	Lotion / Cream	
11.1	-	Klorhexidin/ethanol	Væske	
11.1	-	Chlorhexidine/ethanol	Liquid	
11.2	-	Klorhexidine	Væske	
11.2	-	Chlorhexidin	Liquid	

Grp. No.	ATC-code	Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
12.6	A07DA03	Loperamid	Tablet	
12.6	A07DA03	Loperamide	Tablets	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/ sodium	Pulver	
12.7	-	Glucose/potassium/magnesium/sodium	Powder	
12.8	A02BC01	Omeprazol	Tablet / Kapsel	
12.8	A02BC01	Omeprazole	Tablets / Capsula	
12.9	A02A	Antacida	Tablet or oral pløsning	
12.9	A02A	Antacid	Tablets or oral solution	
12.10	C05A	Hæmoride creme (skal indeholde glukokortikoid og smertestillende middel)	Creme/Salve	
12.10	C05A	Anti haemorrhoid agent (Must contain glucocorticoid and analgesi)	Lotion/ointment	
12.13	A04AA01	Ondansetron	Tablet	
12.13	A04AA01	Ondansetron	Tablets	
12.14	A06AD65	Movicol®	Pulver	
12.14	A06AD65	Movicol®	Powder	
13.4	S01EB51	Pilocarpin	Dråber	
13.4	S01EB51	Pilocarpine	Drops	
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortison	øredråber	
13.12	S02CA03	Ciprofloxacin / Hydrocortisone	eardrops	
13.13	S01AA01	Kloramfenikol	øjensalve	
13.13	S01AA01	Chloramphenicol	eye ointment	
13.14	S01BC03	Diclofenac	Øjendråber	
13.14	S01BC03	Diclofenac	Eye drops	
14.2	G02AB01	Methylergometrin	Tablet	
14.2	G02AB01	Methylergometrine	Tablets	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablet	
15.1	R05DA09	Dextromethorphan	Tablets	
15.5	R01AA07	Xylometazolin	Dråber / spray	
15.5	R01AA07	Xylometazoline	Drops / spray	
15.7	R03AC03	Salbutamol	Spray	
15.7	R03AC03	Salbutamol	Spray	
15.8	R03BA01	Glucocorticoid (inhalation)	Spray	
15.8	R03BA01	Glucocorticoid (inhalation)	Spray	
16.1	B05BB01	Natriumklorid	Inf. Væske	
16.1	B05BB01	Sodium chloride	Inf. Liquid	
16.2	B05BB02	Glucose + Natriumklorid	Inf. Væske	
16.2	B05BB02	Glucose + sodiumchlorid	Inf. Liquid	
16.5	V07AB	Natriumklorid 20 ml	Væske	
16.5	V07AB	Sodium chloride 20 ml	Liquid	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
A.1	Mobilt genoplivningsudstyr	
A.1	Mobile resuscitation equipment	
A.4	Tungeholdere, Grøn, 80mm	
A.4	Guidel airway, Green, 80mm	
A.5	Tungeholdere, Gul, 90mm	
A.5	Guidel airway, Yellow, 90 mm	
A.6	Tungeholdere, Rød, 100mm	
A.6	Guidel airway, Red, 100 mm	
A.7	Ekstra ventilationspose med ventil og voksenmaske	
A.7	Extra ventilation bag with valve and mask	
A.8	Kraftig klædesaks	
A.8	Strong scissors for clothes	
A.9	Sugekatetre, lige, CH 12	
A.9	Suction catheters, straight, CH 12	
A.10	Tæppe til behandling af hypotermi	
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	
A.13	Hudson maske med reservoirpose med ca. 1,8 m slange	
A.13	Hudson mask with reservoir bag with approx. 1.8 m tube	
A.18	Hjertestarter (AED)	
A.18	Automatic extern difibrillator (AED)	
A.19	Iltbrille	
A.19	Nasal Cannula	
B.2	Sterile gazeekompresser, ca.10 x 10 cm, ca.8 lag	
B.2	Sterile gaze compress, approx.10 x 10 cm, approx. 8 layers	
B.4	Sterile kompresforbindinger, ca. 8 cm	
B.4	Sterile compress bandages, approx. 8 cm	
B.5	Imprægnerede net, ca. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.5	Impregnated nets, approx. 10 x 10 cm, Jelonet	
B.6	Steril absorberende forbindinger, ikke klæbende, ca. 10 x 10 cm	
B.6	Sterile absorbent bandages, non-adhesive surgical dressingbandages, approx. 10 x 10 cm	
B.7	Gazeviskers, usterile	
B.7	Gauze swaps, non-sterile	
B.8	Tubegaze til fingerforbindinger	
B.8	Tube shaped gauze for finger bandaging	
B.9	Elastisk gazebind, ca. 4 cmx4m	
B.9	Elastic gauze bandage, approx. 4 cmx4m	
B.10	Hæfteplaster med sårpude, forskellige størrelser, lommepakning	
B.10	Adhesive tape with compress, various sizes, pocket pack	
B.11	Hæfteplaster med sårpude, ca. 6 cm x 1m	
B.11	Adhesive tape with compress, approx. 6 cm x1m	
B.12	Fikseringsplaster Fixomull, ca. 10 cm x 10 m	
B.12	Adhesive tape Fixomull, approx. 10 cm x 10 m	
B.13	Fikseringsplaster, "Englehud", ca. 2 cm	
B.13	Adhesive tape, "peau d'ange", approx. 2 cm	
B.18	Årepresse til massiv blødning	
B.18	Tourniquet for massive bleeding	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
C.1	Engangshandsker af latex, usterile, X-large	
C.1	Disposable gloves, latex, non-sterile, X-large	
C.2	Engangshandsker af latex, usterile, large	
C.2	Disposable gloves, latex, non-sterile, large	
C.5	Vaskesvampe, éngangs	
C.5	Bath sponge, disposable	
C.6	Beskyttelsesbriller	
C.6	Protective goggles	
C.7	Steril afdækning, ca. 50 x 50 cm	
C.7	Sterile drape, approx. 50 x 50 cm	
C.8	Flydende medicinsk sæbe pH 4,5	
C.8	Liquid medical soap pH 4,5	
C.13	Engangsforklæde	
C.13	Disposable apron	
C.14	Lagen, sterilt	
C.14	Bed sheet, sterile	
C.15	Absorberende underlag, ca.6 lag, 60x40 cm, usteril, engangs	
C.15	Absorbent underlay, approx.6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable	
C.16	Opkastpose	
C.16	Vormit bag	
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	
D.1	Suturtape, Steri-Strip™	
D.4	Ikke-absorberbar sutur, 3.0; 45 cm. FS	
D.4	Non-absorbable suture, 3.0; 45 cm. FS	
D.5	Rustfri stålæske med låg, ca. 18x9x3 cm	
D.5	Instrument box, stainless steel with lid, approx. 18x9x3 cm	
D.7	Kirurgisk saks med lige spids	
D.7	Surgical scissors w/straight points	
D.9	Kirurgisk pincet, ca. 14 - 16 cm	
D.9	Surgical forceps (tweezers), approx. 14 -16 cm	
D.11	Splintpincet	
D.11	Forceps, splinter (tweezers)	
D.12	Pean, krum	
D.12	Pean, curved	
D.13	Nåleholder	
D.13	Suture - holder	
D.14	Barbermaskine (skraber), engangs	
D.14	Safety razor, disposable single use	
D.15	Absorberbar hæmostatisk gelatinesvamp, ca.1 x 1 x 1 cm	
D.15	Haemostatic absorbable gelatine sponge, approx.1 x 1 x 1 cm	
D.17	Ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25	
D.17	Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
E.1	Kanylebøtte	
E.1	Box for contaminated needles	
E.2	Afspritningssvaps m. isopropylalkohol 70%	
E.2	Alcohol swaps, isopropyl alcohol 70%	
E.3	Staserem	
E.3	Torniquet	
E.4	Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g	
E.4	Intravenous needle, 1.1 x 32, 20 g	
E.5	Fikseringsplaster til intravenøs kanyle	
E.5	Fixing plaster for intraveneos needle	
E.6	Kanyle, steril til engangsbrug, 0,6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.6	Needle, sterile, disposablesingle use, 0.6 x 30 (~ 23G x 1 1/4)	
E.7	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 2 ml	
E.7	Syringes, sterile, single use, Luer, 2 ml	
E.8	Sprøjter, sterile til engangsbrug, Luer, 5 ml	
E.8	Syringes, sterile, single use, Luer, 5 ml	
E.10	Infusionssæt med gevindtilslutning til E.4, sterile til engangsbrug	
E.10	Infusion set with threaded connection for E.4, sterile, single use	
F.1	Blodtryksmåler	
F.1	Instrument for measuring blood pressure	
F.2	Stetoskop	
F.2	Stethoscope	
F.3	Digitalt lægetermometer	
F.3	Digital clinical thermometer	
F.4	Pencillygte m. batterier	
F.4	Pencil lamp w/batteries	
F.5	Tungespatel, usterile, engangs	
F.5	Tongue depressor, non-sterile, single use disposable	
F.6	Pandelampe	
F.6	Head lamp	
F.7	Hypotermi Termometer	
F.7	Hypotermi thermometer	
G.1	Multistix® 5, urintest for blod/glukose/protein/nitrit/leukocytter	
G.1	Multistix® 5, Urinetest for blood/glucose/protein/nitrite/leukocytes	
G.7	Udstyr til måling af blodsukker	
G.7	Equipment for measuering bloodsugar	
H.1	Pencillygte med UV lys, inkl. batterier	
H.1	Lamp with UV light w/batteries	
H.2	Fluoretsstrips til farvning af øjet	
H.2	Fluorescent colour for the eye	
H.3	Vatpinde, sterile	
H.3	Cotton sticks, sterile	
H.5	Øjenklap	
H.5	Eye patch	
H.6	Øjenskyllevæske, Natriumchlorid 0,9%, 250 ml	
H.6	Eye irrigating liquid, Sodium chlorid e 0.9%, 250 ml	
I.1	Engangskatetre m. krum spids, CH 14, til mænd	
I.1	Catheters for single use w/ curved tip, CH 14 for men	
I.2	Urinkelbe, plastic	
I.2	Bed bottle, plastic	

Grp. No	Medicinsk udstyr / Medical equipment	Mængde/ Quentety
J.1	ColdHot™ kulde/varme omslag, 11 x 27 cm	
J.1	ColdHot™ pack 11 x 24 cm	
J.2	Elastikbind, ca. 10 cm x 5m	
J.2	Elastic bandage, approx. 10 cm x 5m	
J.3	Elastikbind, ca. 6 cm x 5m	
J.3	Elastic bandage, approx. 6 cm x 5m	
J.4	Trekantet tørklæde (Mitella)	
J.4	Triangular scarf (Mitella)	
J.5	Sikkerhedsnåle	
J.5	Safety pins	
J.6	Fingerskinne til immobilisering af ét led	
J.6	Finger splint for immobilisation of one joint	
J.10	Fikseringsplaster, Tensoplast, ca. 2 cm x 2m	
J.10	Adhesive tape, Tensoplast, approx. 2 cm x 2m	
K.2	Oppustelig frakturskinne, senior, hel arm	
K.2	Inflatable fracture splint, senior, full arm	
K.3	Oppustelig frakturskinne, senior, hel ben	
K.3	Inflatable fracture splint, senior, full leg	
K.4	Stiv halskrave, indstillelig til forskellige positioner	
K.4	Stiff neck collar, adjustable	
M.1	Medicinmålebægre, ca. 25 ml, éngangs	
M.1	Graduated measuring cup, approx. 25 ml, disposable	
O.1	Lægebog for Søfarende, udgivet af Seahealth	
O.1	Medical guide for Seafarers issued by Seahealth	
O.2	Søfartsstyrelsens Lægebog	
O.2	The Maritime Medical Manual issued by the Danish Maritime Authority	
O.3	Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning kategori B MFAG B	
O.3	Inventory, Controldocument and Userinstruction Category B MFAG B	
O.5	Radio Medical Optegnelser	
O.5	Radio Medical Records	
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	
O.6	MFAG (Medical First Aid Guide)	
O.3 skal være tilgængelig i digital eller printet udgave. www.soefartsstyrelsen.dk O.3 must be available in digital or printed version. www.dma.dk		

Liste ved aflevering af udløbet medicin til apotek
List when handing over expired medication to a pharmacy

Lægemiddelstof/ Active Pharmaceutical Ingredient	Adm. Form/ Form	Mængde / Amount
MorfinΔ	Inj. Væske	
MorphineΔ	Inj. Liquid	
MorfinΔ	Tablet / Kapsel	
MorphineΔ	Tablet / Capsula	
CyclizinΔ	Tablet	
CyclizineΔ	Tablets	
Diazepam Δ	Tablet	
Diazepam Δ	Tablets	
Diazepam Δ	Klysma	
Diazepam Δ	Enema	
Haloperidol Δ	Inj. Væske	
Haloperidole Δ	Inj. Liquid	
Zolpidem Δ	Tablet	
Zolpidem Δ	Tablets	
Skib - kontrol nr. Ship - control no.	Skibsførerens Navn og Underskrift Masters Name and signature	
Dato / Date	Apotek / Pharmacy, eller/or Agent	
Navn / Name	Underskrift / Signature	
Stempel /stamp		

Mobilt genoplivnings udstyr / Akut taske
Mobile resuscitation kit / Emergency bag

Mobilt genoplivnings udstyr		Version 1-2024
Lovpligtige udstyr.		
Grp. No.	Medicin - Medicinsk udstyr	Mængde
1.3	O ₂ flaske, 2-4 l med 200 Bar,	1 stk.
A.5	Tungholder, Gul, 90 mm	1 stk.
A.7	Ventilationspose med voksen maske og tilhørende slange	1 stk.
A.20	Mekanisk sug med kateter	1 stk.
A.21	Reduktionsventil/Flowregulator	1 stk.
O.8	HLR ombord DK/UK(blå A4)	1 stk.
O.9	Instruktion Reduktionsventil/Flowregulator, DK/UK	1 stk.
Forslag til medicin og udstyr (ikke lovpligtigt)		
A.8	Klædesaks	1 stk.
A.10	Tæppe til behandling af Hypotermi	1 stk.
A.13	O ₂ Hudson maske med reservoirpose	1 stk.
A.19	Iltbrille	1 stk.
A.22	Gaffa tape	1 rulle
B.2	Sterilt gaze kompres, ca. 10 x 10 cm	2 stk.
B.3	Absorberende forbinding, ca. 20 x 30 cm	2 stk.
B.4	Steril gaze forbinding, med kompresfelt ca. 8 cm	2 stk.
B.6	Absorberende forbinding, ca. 10 x 10 cm	2 stk.
B.9	Elastisk gazebind (ikke sterilt) ca. 4 cm x 4 m	2 stk.
B.13	Rulle tape, hudvenlig, ca. 2 cm bred	1 stk.
B.18	Årepresse / Tourniquet til massiv blødning	1 stk.
C.2	Handsker L, ikke-sterile	6 par
E.1	Kanylebøtte	1 stk.
E.2	Afspritningsswabs med isopropyl 70 % alkohol	10 stk.
E.3	Staserem (tourniquet til iv)	1 stk.
E.4	Venekanyle	4 stk.
E.5	Fikserings plaster til iv kanyler	4 stk.
E.6	Kanyle til injektion	4 stk.
E.7	2 ml sprøjte	4 stk.
E.10	Infusion sæt (drop-slange)	1 stk.
F.1	Blodtryksapparat	1 stk.
F.2	Stetoskop	1 stk.
F.4	Pencillygte	1 stk.
K.2	Oppustelig skinne (Urias), senior, hel arm	1 stk.
K.3	Oppustelig skinne (Urias), senior, helt ben	1 stk.
K.4	Halskrave, justérbar (ANLÆGGES KUN PÅ ORDINATION FRA RADIO MEDICAL)	1 stk.
K.6	Mekanisk pumpe til K.2 og K3 (ikke obligatorisk om bord)	1 stk.
O.5	Radio Medical rapport DK eller UK	1 stk.
O.10	Indholdsfortegnelse (har du i hånden)	1 stk.
O.11	Kuglepen	1 stk.
O.12	Halskrave Flowchart – ny instruks	1 stk.
O.13	Halskrave Actioncard– ny instruks	1 stk.
O.14	Clipboard	1 stk.
O.15	Aktionskort, ABCDE, DK>/UK	1 stk.
9.1	Nitroglycerin, spray m 200 doser	1 stk.
11.2	Flaske Klorhexidin 0,2 %	1 stk.
16.1	Saltvand (NaCl) infusionsvæske	1 stk.
16.5	Saltvand (NaCl) 20 ml plastik flaske	2 stk.

Mobile resuscitation equipment		Version 1-2024
Equipment according to Legislation.		
Grp. No.	Medicine - Medical equipment	Quantity
1.3	O ₂ bottle, 2-4 l with 200 bar	1 pc
A.5	Guedel Airway, Yellow, 90mm	1 pc.
A.7	Ventilation bag with adult mask and associate tubing	1 pc
A.20	Mechanical suction with catheter	1 pc
A.21	Reduction valve/Flowregulator	1 pc
O.8	CPR onboard (Blue A4) DK/UK	1 pc
O.9	Instruction Reduction valve/Flowregulator DK/UK	1 pc
Suggestions for medicine and equipment (not legally required)		
A.8	Pair of scissors for clothes	1 pc
A.10	Blanket for treatment of hypothermia	1 pc
A.13	O ₂ Hudson mask with reservoir bag	1 pc
A.19	Nasal Cannula	1 pc
A.22	Duch tape	1 role
B.2	Sterile gauze compress, approx. 10 x 10 cm	2 pcs.
B.3	Absorbing bandage, approx. 20 x 30 cm	2 pcs.
B.4	Sterile, elastic gauze, with compress approx. 8 cm	2 pcs.
B.6	Absorbing bandage, approx. 10 x 10 cm	2 pcs.
B.9	Elastic gauze, (non-sterile) approx. 4 cm x 4 m	2 pcs.
B.13	Roll of adhesive tape for skin, approx. 2 cm wide	1 pc
B.18	Tourniquet for massive bleeding	1 pc
C.2	Gloves L, non-sterile	6 pair
E.1	Needle bin	1 pc
E.2	Alcohol swap with isopropyl 70 % alcohol	10 pcs.
E.3	Tourniquet for IV	1 pc
E.4	Intravenous Cannula	4 pcs.
E.5	Fixating cover, for IV needles	4 pcs.
E.6	Needle for injection	4 pcs.
E.7	2 ml syringe	4 pcs.
E.10	Infusion set (hose)	1 pc
F.1	Instrument for measuring blood pressure	1 pc
F.2	Stethoscope	1 pc
F.4	Pen light	1 pc
K.2	Inflatable splint (Urias), whole arm	1 pc
K.3	Inflatable splint (Urias), senior whole leg	1 pc
K.4	Stiff neck collar, adjustable (ONLY APPLIED IF PRESCRIBED BY RADIO MEDICAL)	1 pc
K.6	Mechanical pump for K.2 and K.3 <i>/not mandatory onboard</i>	1 pc
O.5	Radio Medical Record	1 pc
O.10	List of Contents (in your hand)	1 pc
O.11	Pen	1 pc.
O.12	Neck collar Flowchart - new guide	1 pc.
O.13	Neck collar Actioncard - new guide	1 pc.
O.14	Clipboard	1 pc.
O.15	Action card ABCDE DK/UK	1 pc
9.1	Glyceryl trinitrate , spray 200 dosis	1 pc.
11.2	Bottle Chlorhexidine 0.2	1 pc.
16.1	Sodium chloride (NaCl) Inf. Liquid	1 pc.
16.5	Sodium Chloride (NaCl) 20 ml	2 pcs.

Ændringer / Changes

Version 3.4 July 2025

- A.4 – A.6 Tungeholder farvekoden og størrelse fjernet - mm angivelsen er bedste metode.
- A.4 – A.6 Guidal airway: Color coding and size removed – the millimeter specification is the most reliable.

October version 3.3 2024

- Tilføjet side med liste over lovpligtig udstyr i mobilt genoplivningsudstyr og forslag til ekstra indhold
- 3.9 Morphin er præciseret til Morphinhydrochlorid
- 13.12 **Ciprofloxacin / Hydrocortison** tilføjet i July 2024 opdateringen - manglede i Ændringer/Changes.
- Liste til aflevering af udløbet medicin til apotek er rette.
- A.4 – A.6 Tungeholder er nu defineret i størrelse med farve og millimeter

- Added page with list of mandatory equipment in mobile resuscitation equipment and suggestions for additional content
- 3.9 Morphine is specified as Morphine hydrochloride
- 13.12 **Ciprofloxacin / Hydrocortisone** added in the July 2024 update - was missing from the Ændringer/Changes.
- List to deliver expired medicine to pharmacy is corrected.
- A.4 – A.6 Guidel airway is now defined in size with color and mm

August-2024

- 13.14 mængde er rettet.
- 13.14 amout is corrected.

August-2024

- 4.5 Cinnarizin er udgået af markedet. Erstattes af 4.7 Cyclizin Δ
- 4.5 Cinnarizine is withdraw from market. It is replaced with 4.7 Cyclizine. Δ

July-2024

- 13.13 Kloramphenicol Opbevaring ændret til: Se indlægsseddel
- 13.2 udgået af markedet
- 13.14 Diclofenac erstatter 13.2
- 13.13 Chloramphenicol Storege changed to: See leaflet
- 13.2 Withdrawn from market.
- 13.14 Diclofenac replaces 13.2

July-2024

Medicin som er fjernet / <i>Medicine removed</i>	Medicin som er tilføjet / <i>Medicine added</i>
3.5 Tbl. Tramadol 50 mg	3.9 Tbl. Morfin 10 mg
7.4 Tbl. Erythromycin 500 mg	
7.13 Tbl. Sulfamethoxazol+trimitroprim	7.2 Tbl. Amoxicillin 500 mg A
	7.15 Tbl. Azithromycin 500mg

10.4 Cream Sølvulfadiazin
12.5 Mixtur Laktulose 667 mg/ml
12.12 Tbl. Dompemridon 10 mg
3.8 Dråber/gel Fusidin
13.10 Hydrocortison med Terramycin® og Polymyxin-B komb.
15.2 Turbotaler Terbutalin
15.4 Turbotaler Budesonide
15.6 Inj. Salbutamol
16.6 Gelatine, Natriumchlorid

7.16 Tbl. Pivmecillinam 400 mg. .
7.17 Tbl. Aciclovir 400 mg
9.8 Tbl. Apixaban 5 mg
9.9 Inj. Tranexamsyre 100 mg/ml
10.8 Salve/ointment Fusidin 2%
12.13 Tbl Ondansetron 4 mg
12.14 Pulver /powder Movicol®
13.12 Ciprofloxacin / Hydrocortisone
13.13 Øjensalve/ointment Chloramphenicol
15.7 Inhalation spray Sabumetol
15.8 Inhalation spray glycocortocoid

Medicinsk udstyr som er fjernet / Medical equipment that is removed
E.4 Optiva*2 Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g / Optiva*2 intravenous cannula, 1.1 x 32, 20 g
E.5 Vecafix® Fikseringsplaster til intravenøs kanyle / Vecafix® Fixing plaster for intravenous cannula

Medicinsk udstyr som er tilføjet / Medical equipment that is added
A.18 Hjertestarter (AED) 7/ Automatic external defibrillator (AED)
A.19 Iltbrille / Nasal Cannula
C.15 Absorberende underlag ca. 6 lag 60x40 cm, usteril, engangs / Absorbent underlay, approx. 6 layers, 60x40 cm, non-sterile, disposable
C.16 Opkastpose / Vomitbag
D. 17 Ikke-absorberbar sutur, 5.0; 45 cm. FS eller DS25 / Non-absorbable suture, 5.0; 45 cm. FS eller DS25
E.4 Intravenøs kanyle, 1,1 x 32, 20 g (produkt navn fjernes) / intravenous cannula, 1.1 x 32, 20 g (production name removed)
E.5 Fikseringsplaster til intravenøs kanyle (produkt navn fjernes) / Fixing plaster for intravenous cannula (product name removed)
G.1 Multistix® 5, urintest G.1 Multistix® 5, Urinetest
G.7 Udstyr til måling af blodsukker G.7 Equipment for measuring blood sugar

October 2023

4.1 Adrenalin opbevaring ændret - Læs indlægssedlen for opbevaring
Tilføjet liste for aflevering af udløbet medicin på apotek.

4.1 Epinephrine storage changed - read packet insert for storage
Added list of delivery of expired medicine at the pharmacy

July 2022

E.4 og E.5 Engelsk tekst rettet fra "needle" til cannula.
Generelle rettelser af stavfejl og layout

E.4 og E.5 Text corrected from "needle" to cannula.
General spelling corrections and layout

April 2022

B.14 rettet til B.18 Årepresse til massive blødninger
B.14 corrected to B.18 Tourniquet for massive bleeding.
E.3 change to Tourniquet for i.v.

October 2021

Tilføjet " Id of ship" (side 3)
16.3 Hydroxyethylstivelse udgår
Tilføjet 16.6 Gelatine, Natrium chlorid erstatter 16.3
Tilføjet B.14 Årepresse til pulsåreblødning
Tilføjet C.13 Engangsforklæde
Tilføjet C.14 Lagen, sterilt
Tilføjet F.7 Hypotermi Termometer

Added "Id of ship" (page 3)
16.3 Hydroxyethyl amoid is a discontinued product
Added 16.6 Gelatine Sodium Chlorid replace 16.3
Added B.14 Tourniquet for massive bleeding
Added C.13 Disposable apron
Added C.14 Bed sheet, sterile
Added F.7 Hypotermi thermometer

July 2021

6.3 Diazepam klysma styrke rettet tilbage til 4mg/ml - beklager ulejligheden
6.3 Diazepam enema strength corrected back to 4mg/ml - Sorry for the inconvenience
7.10 Vaccine Tetanus- label tilrettet
7.10 Vaccine Tetanus - label corrected
COVID-19 tillæg - overskrifter rettet. Tilføjet at hurtigtest skal være CE mærket
COVID-19 add on - the headlines corrected. Added that the quick test have to be CE marked

January 2021

Tilføjet side med ekstramedicin og medicinsk udstyr i forbindelse med Covid-19. Side 82->
Det er frivilligt om skibet vil medbringe medicinen og udstyr eller dele deraf.
Added page with additional medicine and medical equipment in connection with Covid-19. Page ->82
It is optional if the ship will bring the medicine and equipment or part of it

Oktober 2020

7.10 Tetanus holdig vaccine – styrke og ATC kode fjernet,
da det kommer an på hvad der udleveres - følg råd fra Radio Medical.
7.10 Tetanus-containing vaccine – strength and ATC code removed,
as it depends on what is delivered - follow advice from Radio Medical.
6.3 Diazepam klysma – styrke ændret til 5 mg/ml
6.3 Diazepam enema – strength changed to 5 mg/ml

Marts 2020

Ændringer er nu på sidste side
Changes is now a the last page
7.1 Phenoxymethylpenicillin styrken er ændret til 660 mg - 800 mg
7.1 Phenoxymethylpenicillin strenght change to 660 mg - 800 mg
D.4 Suture fjernet firma navn.
D.4 Suture removed company name
Note ved O.2 fjernet
Note to O.2 removed

November 2017

- 7.10 Tetanus vaccine ændre til Tetanusholdig vaccine
- 7.10 Tetanus vaccine change to Vaccine containing Tetanus.

August 2017

- O.2 Tilføjet nye lægebog fra Seahealth
- O.2 Add. new medical guide from Seahealth